

## Оглавление

1. Лекция 1. Арифметика и топология поля $\mathbb{C}$ . Предел и непрерывность. Экспонента и логарифм.	2
2. Лекция 2. Связность. Теорема Жордана. Стереографическая проекция. Односвязная область. Оболочка компакта.	7
3. Лекция 3. Комплексная производная. Производная сложной и обратной функции. $\mathbb{C}$ - и $\mathbb{R}$ -дифференцируемость. Теорема Коши - Римана. Свойства производных. Производная по направлению. Голоморфность в точке и области.	12
4. Лекция 4. Конформные отображения. Дробно-линейные отображения и их свойства.	17
5. Лекция 5. Группы ДЛО-автоморфизмов $B_1$ , $\mathbb{P}_+$ , $\mathbb{C}$ . Функция Жуковского. Тригонометрические функции. Многозначные функции и их однозначные ветви.	22
6. Лекция 6. Непрерывная ветвь $m$ -функции $\text{Arg}(z)$ вдоль пути. Индекс пути относительно точки. Эквивалентные пути. Действия с кривыми. Спряжляемые пути и кривые. Интеграл вдоль кривой по комплексной переменной	28
7. Лекция 7. Интеграл вдоль непрерывно-дифференцируемого пути. Лемма Гурса. Лемма о приближении.	33
8. Лекция 8. Теорема Коши для односвязной области. Существование первообразной в односвязной области. Формула Ньютона-Лейбница. Интегральная теорема Коши для допустимых областей.	38
9. Лекция 9. Доказательство ИТК для простых областей. Интегральная формула Коши. Теорема о среднем и принцип максимума модуля. Формула Коши для производных. Теорема Морера.	43
10. Лекция 10. Теорема Вейерштрасса. Степенные ряды. Теорема Коши-Тейлора и её следствия.	48
11. Лекция 11. Теорема о нулях и теорема единственности для ГФ. Пространства Бергмана $\mathcal{A}^p(D)$ и пространство $\mathcal{A}(D)$ . Обобщенные степенные ряды. Теорема Лорана. Связь рядов Лорана и Фурье.	53
12. Лекция 12. Классификация изолированных особых точек (ИОТ) ГФ. Теорема Сохоцкого. Лемма Шварца и её следствие. ИОТ $\infty$ . Вычеты в ИОТ.	58
13. Лекция 13. Теорема Коши о вычетах. Примеры вычисления интегралов. Лемма Жордана и преобразование Фурье рациональных функций. Специальные области и функция Шварца.	63
14. Лекция 14. Интеграл в смысле главного значения. Вычет функции в точке относительно области. Теорема о вычетах для $(vp) \int$ . Примеры вычисления $(vp) \int$ .	68
15. Лекция 15. Гармонические функции двух переменных. Базовые свойства. Задача Дирихле. Разложение в ряд по однородным гармоническим полиномам.	73

# 1. Лекция 1. Арифметика и топология поля $\mathbb{C}$ . Предел и непрерывность. Экспонента и логарифм.

## Алгебраическая форма записи комплексных чисел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1. *Поле комплексных чисел* называется множество


$$\mathbb{C} = \{x + iy \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, i - \text{символ}\}$$

с операциями

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \\ z_1 \cdot z_2 &= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1), \end{aligned}$$

где  $z_{1,2} = x_{1,2} + iy_{1,2}$ .

Выражение  $z = x + iy$  называется *алгебраической формой* комплексного числа  $z$ ;  $\operatorname{Re} z = x$  и  $\operatorname{Im} z = y$  — его *действительной* и *мнимой частями* соответственно.



УПРАЖНЕНИЕ 1.1. Проверить, что  $\mathbb{C}$  — поле (9 аксиом), нулем и единицей в котором являются  $0 = 0 + i \cdot 0$  и  $1 = 1 + i \cdot 0$  соответственно. Подполе  $\{x + i \cdot 0 \mid x \in \mathbb{R}\}$  изоморфно  $\mathbb{R}$  (далее они отождествляются),  $i^2 = -1$ .

*Указание:* ассоциативность умножения удобнее проверять в тригонометрической форме, которая будет определена ниже.

Важно понимать, что

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2. Если  $z = x + iy$ , то его *комплексно сопряженным* называется число  $\bar{z} = x - iy$ , а его *модулем* — число  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$ .

При  $z \neq 0$  обратный элемент к  $z$  вычисляется по формуле

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \left( -\frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

Множество комплексных чисел интерпретируется как совокупность точек (или их радиус-векторов) декартовой плоскости  $Oxy$ . При этом отображение  $z \mapsto \bar{z}$  — это симметрия относительно оси  $Ox$ .

УПРАЖНЕНИЕ 1.2. Каков геометрический смысл отображения  $z \mapsto iz$ ?

### Тригонометрическая форма записи комплексных чисел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3. Полярным радиусом числа  $z = x + iy$  называется его модуль:  $r = |z|$ .

Если  $z \neq 0$ , то существует единственное  $\varphi_0 \in (-\pi, \pi]$  с условиями  $x = r \cos(\varphi_0)$ ,  $y = r \sin(\varphi_0)$ . Это  $\varphi_0$  называется *главным значением (полярного) аргумента*  $z$  и обозначается  $\varphi_0 = \arg(z)$ . Отметим, что углы у нас всегда измеряются в радианах. Совокупным (полярным) аргументом числа  $z$  называется множество

$$\text{Arg}(z) = \{ \varphi_0 + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

Если  $\varphi \in \text{Arg } z$ , то  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ . Последнее выражение называется *тригонометрической формой* числа  $z$  (при  $\varphi = \varphi_0$  — *основной тригонометрической формой*).

Элементарно проверяется, что при  $\varphi_{1,2} \in \text{Arg}(z_{1,2})$ ,  $r_{1,2} = |z_{1,2}|$  справедливо равенство

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Отсюда следует *формула Муавра*: если  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$ , то

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (1.1)$$

ПРИМЕР 1.1. Вычислим  $(1 - i)^{15}$ .

$$(1 - i)^{15} = \left( \sqrt{2} \left( \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \right)^{15} = 2^{\frac{15}{2}} \left( \cos\left(-\frac{15\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{15\pi}{4}\right) \right) = 2^7 (1 + i).$$

### Извлечение корней из комплексных чисел.

Пусть  $n \in \{2, 3, \dots\}$ . По определению,  $w \in \sqrt[n]{z} \iff w^n = z$ .

Ясно, что  $\sqrt[n]{0} = \{0\}$ . Из (1.1) следует, что при  $z \neq 0$  совокупность  $\sqrt[n]{z}$  состоит из  $n$  элементов  $\{w_0, w_1, \dots, w_{n-1}\}$ , находящихся по формуле

$$w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left( \cos\left(\frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n}\right) \right), \quad k = 0, \dots, n - 1.$$

Элемент  $w_0$  называется *главным (основным) значением*  $\sqrt[n]{z}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 1.3. Доказать, что в последних обозначениях

$$w_0 + w_1 + \dots + w_{n-1} = 0.$$

Следующие теоремы известны из курса алгебры.

ТЕОРЕМА 1.1. (*Основная теорема алгебры*). Поле комплексных чисел алгебраически замкнуто, т.е. всякий многочлен  $p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n \neq 0$ ,  $a_k \in \mathbb{C}$ ,  $k \in \{0, \dots, n\}$ , имеет корень в  $\mathbb{C}$ .

ТЕОРЕМА 1.2. (*Частный случай теоремы Фробениуса*). Пусть  $\mathbb{P}$  — поле, содержащее  $\mathbb{C}$ , причем  $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{P} < \infty$ . Тогда  $\mathbb{P} = \mathbb{C}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 1.4. Привести пример какого-либо бесконечномерного поля  $\mathbb{P}$  над  $\mathbb{C}$ .

### Топология (метрика) в $\mathbb{C}$ .

В  $\mathbb{C}$  вводится метрика  $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$  (как в  $\mathbb{R}^2$ ). Через  $B(a, r)$  обозначается *открытый круг*  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < r\}$  с центром  $a \in \mathbb{C}$  и радиусом  $r > 0$ .

Предполагаются известными определения *открытых, замкнутых, ограниченных, компактных, связных* множеств в произвольном метрическом пространстве (в частности, в  $\mathbb{R}^2$ ). Тем не менее, ряд основных понятий мы напомним.

**Предел последовательности в  $(\mathbb{C}, d)$ . Экспонента.**

Пусть  $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ ,  $a \in \mathbb{C}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4. Говорят, что число  $a$  является пределом последовательности  $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  при  $n \rightarrow +\infty$ , и пишут

$$a = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n,$$

если  $\forall \varepsilon > 0$  найдется  $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$  такое, что  $\forall n > N_\varepsilon$  имеем  $d(z_n, a) < \varepsilon$ .

УПРАЖНЕНИЕ 1.5. Пусть  $z_n = x_n + i y_n$ . Тогда

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \operatorname{Re} a \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \operatorname{Im} a \end{cases}$$

УПРАЖНЕНИЕ 1.6. (1)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = 0$ .

(2) При  $a \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = |a|, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Arg}(z_n) = \operatorname{Arg}(a) \pmod{2\pi}. \end{cases}$$

Последнее равенство понимается так. Найдутся  $\varphi_n \in \operatorname{Arg}(z_n)$  и  $\varphi_0 \in \operatorname{Arg}(a)$  такие, что  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n = \varphi_0$ .

Рассмотрим пример. *Фиксируем* произвольное  $z \in \mathbb{C}$ . Определим

$$e^z = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n,$$

т.е. докажем, что данный предел существует, и обозначим его через  $e^z$ . Считаем стандартные свойства функции  $e^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , известными.

Пусть, как всегда,  $z = x + i y$ . Тогда

$$\left|1 + \frac{z}{n}\right|^n = \left|\left(1 + \frac{x}{n}\right) + i \frac{y}{n}\right|^n = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \left(\frac{y}{n}\right)^2\right)^{\frac{n}{2}} = \exp\left(\frac{n}{2} \ln\left(1 + \frac{x^2}{n^2} + \frac{y^2}{n^2} + \frac{2x}{n}\right)\right),$$

откуда, ввиду известного соотношения  $\ln(1+t) \sim t$  при  $t \rightarrow 0$  ( $t \in \mathbb{R}$ ), находим

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left|1 + \frac{z}{n}\right|^n = e^x.$$

Найдем теперь предел (полярного) аргумента последовательности  $w_n = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$  (по  $\pmod{2\pi}$ ). Если  $n \gg 1$ , то  $|z/n| < 1$ , поэтому  $\left(1 + \frac{z}{n}\right)$  находится в правой полуплоскости и справедливо равенство

$$\arg\left(1 + \frac{z}{n}\right) = \operatorname{arctg} \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} \sim \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}}, \quad n \rightarrow +\infty.$$

Из формулы Муавра получаем, что предел последовательности  $\operatorname{Arg}(w_n) \sim y/(1+x/n)$  (по  $\pmod{2\pi}$ ) существует и

$$y \in \operatorname{Arg}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n\right).$$

Итак,

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^x (\cos y + i \sin y) =: e^z.$$

В частности, если  $x = 0$ , то  $e^z = e^{iy} = \cos y + i \sin y$ . Например,

$$e^{2\pi i} = 1. \tag{1.2}$$

Кроме того, из тригонометрической формы комплексных чисел,  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ , получаем *показательную форму* записи комплексных чисел:  $z = r e^{i\varphi}$ .

Пусть теперь  $z_j = x_j + i y_j$ ,  $j \in \{1, 2\}$ . Тогда, по доказанному,

$$e^{z_1+z_2} = e^{x_1+x_2} (\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)) = e^{x_1+x_2} ((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i (\sin y_1 \cos y_2 + \sin y_2 \cos y_1)) = e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) \cdot e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{z_1} e^{z_2}. \quad (1.3)$$

Из (1.2) и (1.3) имеем:

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

Число  $2\pi i$  называется *основным периодом экспоненты*.

### Предел функции. Непрерывность. Классы $o(\cdot)$ и $O(\cdot)$ .

В дальнейшем через  $B'(z_0, r)$  обозначается проколота  $r$ -окрестность точки  $z_0$ , т.е.  $B'(z_0, r) = B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ .

Пусть  $E \subset \mathbb{C}$ ,  $E \neq \emptyset$ ,  $z_0$  – предельная точка  $E$  (т.е. в любой проколотаой окрестности точки  $z_0$  есть точка из  $E$ ) и пусть  $f: E \rightarrow \mathbb{C}$  – некоторая функция. Говорят, что  $f$  имеет предел  $A \in \mathbb{C}$  при  $z$  стремящемся к  $z_0$  (по  $E$ ), и пишут

$$\lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ z \in E}} f(z) = A, \quad (1.4)$$

если  $\forall \varepsilon > 0$  найдется  $\delta > 0$  такое, что  $\forall z \in B'(z_0, \delta) \cap E$  имеем  $f(z) \in B(A, \varepsilon)$ .

Если  $E$  содержит некоторую проколотаую окрестность точки  $z_0$ , то строка  $z \in E$  в записи (1.4) опускается.

Функция  $f$  называется *непрерывной в точке*  $z_0 \in E$  (по  $E$ ), если  $\lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ z \in E}} f(z) = f(z_0)$  (когда  $z_0$  – предельная точка  $E$ ), либо  $z_0$  – изолированная точка в  $E$ .

Функция  $f$  называется *непрерывной на множестве*  $E_1 \subset E$  (по  $E$ ), если она непрерывна в каждой точке этого множества (по  $E$ ).

Напомним, что через  $o(1)$  (при  $z \rightarrow z_0$ ) обозначается класс всех функций  $h$ , определенных в (каждая  $h$  в своей) проколотаой окрестности точки  $z_0$  и удовлетворяющих условию  $\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = 0$ .

Если функция  $g$  определена в некоторой проколотаой окрестности точки  $z_0$ , то через  $o(g(z))$  (или  $o(g)$  при  $z \rightarrow z_0$ ) обозначается класс функций  $g(z)o(1)$  (при  $z \rightarrow z_0$ ).

Есть надежда, что читатели сами легко вспомнят определения классов  $O(1)$  и  $O(g)$  (при  $z \rightarrow z_0$ ).

В качестве примера работы с классами  $o(\cdot)$  и  $O(\cdot)$  покажем, что

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1.$$

Пусть, как всегда,  $z = x + i y$ . Тогда  $z \rightarrow 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \end{cases}$ , откуда

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y) = (1 + x + o(x)) \cdot (1 + i y + o(y)) = 1 + z + o(z), \quad z \rightarrow 0. \quad (1.5)$$

Следовательно,  $(e^z - 1)/z \rightarrow 1$  при  $z \rightarrow 0$ , что и требовалось.

УПРАЖНЕНИЕ 1.7. Доказать:

$$(1) o(x) \not\subset o(z), o(y) \not\subset o(z), z \rightarrow 0; \quad (2) o(z) = o(\bar{z}) = o(|z|), z \rightarrow 0.$$

### Экспонента и логарифм.

Как обычно, полагаем  $z = x + iy$  и  $w = u + iv$ .

Пусть  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  удовлетворяют условию  $-\infty < \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi < +\infty$ . Определим, куда переходит горизонтальная полоса  $\Pi_{(\alpha, \beta)} = \{z \in \mathbb{C} \mid \alpha < \operatorname{Im} z < \beta\}$  под действием отображения  $w = e^z$ .

Сначала посмотрим куда перейдет горизонтальная прямая  $z_1(t) = t + iy_0$ ,  $t \in \mathbb{R}$  ( $y_0 \in (\alpha, \beta)$  фиксировано):

$$w_1(t) = e^{z_1(t)} = e^{t+iy_0} = e^t \cdot e^{iy_0}, t \in \mathbb{R},$$

– (открытый) луч на плоскости  $w$ , выходящий из точки 0 под углом  $y_0$  (в радианах) к оси  $Ox$ .

Пусть теперь  $z_2(t) = x_0 + it$ ,  $t \in (\alpha, \beta)$ , – вертикальный интервал полосы  $\Pi_{(\alpha, \beta)}$ . Тогда

$$w_2(t) = e^{z_2(t)} = e^{x_0} \cdot e^{it}, t \in (\alpha, \beta),$$

– дуга окружности радиуса  $e^{x_0}$  с центром в точке 0 на плоскости  $w$ , проходящая между лучами  $\{w \in \mathbb{C} : \alpha \in \operatorname{Arg} w\}$  и  $\{w \in \mathbb{C} : \beta \in \operatorname{Arg} w\}$ .

Таким образом,  $\Pi_{(\alpha, \beta)}$  под действием экспоненты переходит в угол  $V_{(\alpha, \beta)} = \{w \in \mathbb{C} \mid \alpha < \arg w < \beta\}$  (здесь берется конкретная однозначная ветвь  $\arg w$   $_{(\alpha, \beta)}$  функции  $\operatorname{Arg} w$ , удовлетворяющая указанным условиям).

Нетрудно видеть, что экспонента является гомеоморфизмом  $\Pi_{(\alpha, \beta)}$  на  $V_{(\alpha, \beta)}$ .

Обратное к этому отображение обозначается так:  $z = \ln_{(\alpha, \beta)} w$ .

Определим теперь *многозначную* функцию  $\operatorname{Ln}(z)$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5.  $w \in \operatorname{Ln} z \Leftrightarrow z = e^w$  (ясно, что  $z \neq 0$ ).

Представим  $z$  в основной тригонометрической форме:  $z = re^{i\varphi_0}$ . Поскольку  $z = e^w = e^u \cdot e^{iv}$ , получаем, что  $u = \ln r$ ,  $v = \varphi_0 + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  (проверить!). Таким образом,

$$\operatorname{Ln}(z) = \{ \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k) \mid k \in \mathbb{Z} \}, z \neq 0.$$

*Основной ветвью логарифма* называется функция  $\ln(z) = \ln |z| + i \arg z$ ,  $z \neq 0$ . Слева в последнем равенстве  $\ln$  обозначает определяемую здесь функцию *комплексной переменной*  $z$ , справа – уже известную логарифмическую функцию положительного аргумента. Нетрудно видеть, что  $\ln(z) = \ln_{(-\pi, \pi)}(z)$  на  $V_{(-\pi, \pi)}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 1.8. Доказать, что при  $-\infty < \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi/n < +\infty$  отображение  $w = z^n$  является гомеоморфизмом угла  $V_{(\alpha, \beta)}$  на угол  $V_{(n\alpha, n\beta)}$ . Обратное к нему отображение обозначается следующим образом:

$$z = \sqrt[n]{w}_{(n\alpha, n\beta)} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln_{(n\alpha, n\beta)}(w)\right).$$

В частности,  $\sqrt[n]{w}_{(-\pi, \pi)} = \sqrt[n]{w}_{(0)}$  на  $V_{(-\pi, \pi)}$ . Каково множество точек разрыва функции

$\sqrt[n]{z}_{(0)}$  в  $\mathbb{C}$ ?

## 2. Лекция 2. Связность. Теорема Жордана. Стереографическая проекция. Односвязная область. Оболочка компакта.

### Связные множества.

Пусть  $(T, \tau)$  – топологическое пространство ( $\tau$  – система всех открытых подмножеств в  $T$  с известным набором свойств).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Пусть  $X \subset T$  и существуют  $U_1, U_2 \in \tau$  со следующими свойствами:

$$(1) : U_1 \cap X \neq \emptyset; (2) : U_2 \cap X \neq \emptyset; (3) : U_1 \cap U_2 = \emptyset; (4) : X \subset U_1 \cup U_2.$$

Тогда множества  $U_1$  и  $U_2$  называются *разделяющими (для  $X$ )*, а множество  $X$  называется *несвязным* в  $(T, \tau)$ . Если для  $X \neq \emptyset$  не существует разделяющих множеств, то  $X$  называется *связным* в  $(T, \tau)$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2. Пусть  $X \subset T$ . Подмножество  $X_1 \subset X$  называется *связной компонентой* множества  $X$ , если  $X_1$  связно и не существует связного множества  $X_2$  со свойством  $X_1 \subsetneq X_2 \subseteq X$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3. *Областью* в  $\mathbb{C}$  называется всякое (непустое) открытое связное множество в  $\mathbb{C}$ .

При  $E \subset \mathbb{C}$  через  $\partial E$  обозначается *граница* множества  $E$  в  $\mathbb{C}$ , а через  $\bar{E}$  – *замыкание* множества  $E$  в  $\mathbb{C}$ .

### Пути и кривые в $\mathbb{C}$ . Теорема Жордана.

Пусть  $(T, \tau)$  – топологическое пространство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4. Пусть  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha < \beta$ , и пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow (T, \tau)$  – непрерывное отображение. Тогда  $\gamma$  называется *путем* в  $(T, \tau)$ , а множество  $[\gamma] = \gamma([\alpha, \beta])$  – его *носителем*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5. Множество  $X \subset T$ ,  $X \neq \emptyset$ , называется *линейно связным*, если для любых  $x_1, x_2 \in X$  существует путь  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow (T, \tau)$ ,  $[\gamma] \subset X$ , с условием  $\gamma(\alpha) = x_1$ ,  $\gamma(\beta) = x_2$ .

УПРАЖНЕНИЕ 2.1. Доказать эквивалентность понятий связности и линейной связности для открытых множеств в  $\mathbb{C}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.6. Путь  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  называется *жордановым*, если он взаимно однозначен на  $[\alpha, \beta]$  (т.е.  $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$  при  $\alpha \leq t_1 < t_2 \leq \beta$ ).

Путь  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  называется *замкнутым жордановым*, если  $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$  при всех  $\alpha \leq t_1 < t_2 < \beta$ , но  $\gamma(\alpha) = \gamma(\beta)$ .

ТЕОРЕМА 2.1. (Жордана). Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь в  $\mathbb{C}$  с носителем  $S = \gamma([\alpha, \beta])$ . Обозначим  $\Omega = \mathbb{C} \setminus S$ .

- (1) Если  $\gamma$  – жорданов путь, то  $\Omega$  связно и  $\partial \Omega = S$ .
- (2) Если  $\gamma$  – замкнутый жорданов путь, то  $\Omega$  состоит ровно из двух непересекающихся компонент (областей): ограниченной ( $D_\gamma$ ) и неограниченной ( $\Omega_\gamma$ ), причем  $\partial D_\gamma = \partial \Omega_\gamma = S$ .

В программу экзамена включается доказательство этой теоремы для случая произвольной замкнутой жордановой ломаной (см. СК, лекция 2).

УПРАЖНЕНИЕ 2.2. Привести пример двух непересекающихся ограниченных областей  $D_1$  и  $D_2$  в  $\mathbb{C}$  с условием  $\partial D_1 = \partial D_2$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.** Пусть  $(T, \tau)$  – хаусдорфово локально-компактное топологическое пространство. Его *одноточечной компактификацией* (по Александру) называется топологическое пространство  $(T^\sharp, \tau^\sharp)$ , где  $\infty$  – символ ( $\infty \notin T$ ),

$$T^\sharp = T \sqcup \{\infty\}, \quad \tau^\sharp = \tau \sqcup \{T^\sharp \setminus K\}_{K \in \mathcal{K}},$$

где  $\mathcal{K}$  – совокупность всех компактных подмножеств в  $(T, \tau)$ .

При этом  $(T^\sharp, \tau^\sharp)$  компактно и хаусдорфово, а вложение  $(T, \tau)$  в  $(T^\sharp, \tau^\sharp)$  непрерывно.

Одноточечная компактификация комплексной плоскости  $\mathbb{C}$  (с её стандартной топологией) называется *расширенной комплексной плоскостью* (часто обозначаемой  $\overline{\mathbb{C}}$ , но мы придерживаемся обозначения  $\mathbb{C}^\sharp$ ).

### Сферическая метрика на $\mathbb{C}^\sharp$ . Стереографическая проекция.

Ранее на комплексной плоскости была введена евклидова метрика:

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Определим *сферическую* метрику на  $\mathbb{C}^\sharp = \mathbb{C} \sqcup \{\infty\}$ :

$$d^\sharp(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{1+|z_1|^2} \sqrt{1+|z_2|^2}}, & z_1, z_2 \in \mathbb{C} \\ \frac{1}{\sqrt{1+|z_1|^2}}, & z_1 \in \mathbb{C}, z_2 = \infty \\ 0, & z_1 = z_2 = \infty \end{cases}$$

Из предложения 2.1 будет следовать, что  $d^\sharp(\cdot, \cdot)$  удовлетворяет аксиомам метрики, причем топология, задаваемая этой метрикой, является топологией одноточечной компактификации плоскости  $\mathbb{C}$ .

Рассмотрим в  $\mathbb{R}_{(\xi, \eta, \zeta)}^3$  сферу  $\Sigma$  с радиусом  $1/2$  и центром в точке  $(0, 0, 1/2)$  и отождествим  $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$  с подпространством  $\mathbb{R}_{(\xi, \eta)}^2 \subset \mathbb{R}_{(\xi, \eta, \zeta)}^3$ . Введем обозначения  $O = (0, 0, 0)$ ,  $N = (0, 0, 1)$ .

Любой точке  $M = (\xi, \eta, \zeta) \in \Sigma \setminus N$  можно сопоставить точку  $z = z_M$  комплексной плоскости  $\mathbb{C}_z = \mathbb{R}_{(x, y)}^2$ , продолжив луч  $NM$  до пересечения с последней.

Отображение  $\sigma : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}^\sharp$ , заданное по правилу

$$\sigma(M) = \begin{cases} z_M, & M \neq N \\ \infty, & M = N \end{cases}$$

называется *стереографической проекцией*. Легко видеть, что оно взаимно однозначно. Будем обозначать  $M_z = \sigma^{-1}(z)$ ,  $z \in \mathbb{C}$ ;  $N = \sigma^{-1}(\infty)$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 2.3.** Вывести формулы стереографической проекции:

$$x = \frac{\xi}{1 - \zeta}; \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}; \quad \xi = \frac{x}{1 + |z|^2}; \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2}; \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2},$$

пользуясь коллинеарностью векторов  $\overrightarrow{NM}$  и  $\overrightarrow{Nz_M}$  и уравнением сферы  $\Sigma$ . В данном случае  $M_z = (\xi, \eta, \zeta)$ , где  $z = x + iy \in \mathbb{C}$ .

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1.** Если  $\rho(A, B)$  – евклидово расстояние (в  $\mathbb{R}_{(\xi, \eta, \zeta)}^3$ ) между точками  $A$  и  $B$ , то во введенных выше обозначениях имеем:

$$d^\sharp(z_1, z_2) = \rho(M_{z_1}, M_{z_2}).$$

Таким образом,  $\sigma : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}^\sharp$  – изометрия  $(\Sigma, \rho)$  и  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$ . Поскольку  $(\Sigma, \rho)$  – компактное метрическое пространство,  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$  – тоже компактно. Поэтому  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$  (расширенную плоскость) часто называют *сферой Римана*.






Рис. 2.1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обсудим случай конечных  $z_1$  и  $z_2$ . Рассмотрим плоскость, проходящую через точки  $O, N, z_1$ . Она пересекает  $\sigma$  по окружности с диаметром  $ON = 1$ , причем  $M_{z_1}$  лежит на этой окружности, откуда  $\angle NM_{z_1}O = \pi/2$  (см. рис. 2.1 c)). Следовательно,  $\Delta M_{z_1}NO \sim \Delta ONz_1$ , откуда

$$\frac{NM_{z_1}}{NO} = \frac{NO}{Nz_1} \Rightarrow NM_{z_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + |z_1|^2}}. \quad (2.1)$$

Аналогично,

$$NM_{z_2} = \frac{1}{\sqrt{1 + |z_2|^2}}. \quad (2.2)$$

Обозначим  $\delta = \rho(M_{z_1}, M_{z_2})$  и воспользуемся теоремой косинусов в  $\Delta M_{z_1}M_{z_2}N$  и в  $\Delta z_1z_2N$  (см. рис. 2.1 b)):

$$\begin{aligned} \delta^2 &= (NM_{z_1})^2 + (NM_{z_2})^2 - 2NM_{z_1} \cdot NM_{z_2} \cos \beta, \\ \cos \beta &= \frac{|z_1 - z_2|^2 - (Nz_1)^2 - (Nz_2)^2}{-2Nz_1 \cdot Nz_2}. \end{aligned}$$

Подставив второе равенство в первое, с учетом (2.1) и (2.2) получаем  $\delta^2 =$

$$= \frac{1}{1 + |z_1|^2} + \frac{1}{1 + |z_2|^2} + \frac{|z_1 - z_2|^2 - (1 + |z_1|^2) - (1 + |z_2|^2)}{(1 + |z_1|^2) \cdot (1 + |z_2|^2)} = \frac{|z_1 - z_2|^2}{(1 + |z_1|^2) \cdot (1 + |z_2|^2)}.$$

Что и требовалось. Случаи бесконечных  $z_1$  или  $z_2$  устанавливаются предельным переходом.  $\square$

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Метрики  $d$  и  $d^\sharp$  мажорируют друг друга на любом круге конечного радиуса в  $\mathbb{C}$ . Отсюда следует, что все понятия, определяемые в терминах окрестностей (например, открытые множества, пределы последовательностей и функций), совпадают в  $(\mathbb{C}, d)$  и в  $(\mathbb{C}, d^\sharp)$ .

Действительно, для  $z_1$  и  $z_2$  из некоторого круга  $B(0, R)$ ,  $R \in (0, +\infty)$ , имеем  $\sqrt{1 + |z_1|^2}, \sqrt{1 + |z_2|^2} \in [1, \sqrt{1 + R^2})$ , откуда  $(\sqrt{1 + |z_1|^2} \sqrt{1 + |z_2|^2})^{-1} \in [1/(1 + R^2), 1]$ . Следовательно,

$$\frac{d(z_1, z_2)}{1 + R^2} \leq d^\sharp(z_1, z_2) \leq d(z_1, z_2).$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.4.** Доказать, что при стереографической проекции окружности на сфере Римана переходят в обобщенные окружности в  $\mathbb{C}^\sharp$  (круговое свойство стереографической проекции).

**УПРАЖНЕНИЕ 2.5.** Доказать свойство сохранения (абсолютных величин) углов между (обобщенными) окружностями при стереографической проекции.

### Односвязные области в $\mathbb{C}$ .

Для  $E \subset \mathbb{C}$  обозначим через  $E_c = \mathbb{C} \setminus E$  – дополнение (complement) множества  $E$  в  $\mathbb{C}$ , а через  $\partial E$  – границу  $E$  в  $(\mathbb{C}, d)$ .

Аналогично, для  $E \subset \mathbb{C}^\sharp$  пусть  $E_c^\sharp = \mathbb{C}^\sharp \setminus E$  – дополнение множества  $E$  в  $\mathbb{C}^\sharp$  и  $\partial^\sharp E$  – граница  $E$  в  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$ .

Так, при  $E \subset \mathbb{C}$ , если  $E$  ограничено, то  $\partial^\sharp E = \partial E$ ; если  $E$  не ограничено, то  $\partial^\sharp E = \partial E \sqcup \{\infty\}$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.8.** Область  $D \subset \mathbb{C}$  называется *односвязной*, если  $D_c^\sharp$  связно в  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$ .

Рассмотрим несколько примеров.

- (1) Пусть  $D$  – произвольная звездная область в  $\mathbb{C}$  (т.е. найдется точка  $z_0 \in D$  такая, что для любой точки  $z \in D$  отрезок  $[z_0, z]$  целиком лежит в  $D$ ). Тогда  $D_c^\sharp$  является линейно связным множеством (а, значит, и связным) в  $\mathbb{C}^\sharp$ . Следовательно,  $D$  – односвязная область.
- (2) В частности, пусть  $D = \Pi_{(\alpha, \beta)} = \{z \in \mathbb{C} \mid \alpha < \operatorname{Im} z < \beta\}$  – полоса (звездна относительно любой своей точки, как и любая выпуклая область в  $\mathbb{C}$ ). По предыдущему примеру, она односвязна. В то же время  $D_c$  не связно в  $(\mathbb{C}, d)$ .
- (3) Пусть  $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Тогда  $D_c^\sharp = \{0\} \sqcup \{\infty\}$  – не связное множество в  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$ , значит  $D$  не односвязна. (Заметим, однако, что  $D_c = \{0\}$  связно в  $(\mathbb{C}, d)$ .)

**УПРАЖНЕНИЕ 2.6.** Если  $D$  область в  $\mathbb{C}$  и  $\partial^\sharp D$  связно в  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$ , то и  $D_c^\sharp$  связно в  $(\mathbb{C}^\sharp, d^\sharp)$ , т.е.  $D$  – односвязная область.

Обратное тоже верно, но доказывается гораздо сложнее. Мы установим этот факт в следующем семестре, пока он нам не потребуется. Мы также установим, что область  $D$  в  $\mathbb{C}$  односвязна, если и только если она гомеоморфна кругу.

### Оболочка компакта.

Пусть  $K$  – компакт в  $\mathbb{C}$  (т.е. замкнутое ограниченное множество).

УПРАЖНЕНИЕ 2.7. Множество  $\mathbb{C} \setminus K$  распадается на не более чем счетное множество непересекающихся областей (связных компонент), причем среди них есть ровно одна неограниченная.

Пусть  $D_1, D_2, \dots$  – ограниченные компоненты  $\mathbb{C} \setminus K$  (если такие есть),  $\Omega$  – неограниченная компонента  $\mathbb{C} \setminus K$ .

УПРАЖНЕНИЕ 2.8.  $\partial D_j \subset K, \partial \Omega \subset K$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.9. Множество  $\widehat{K} = K \sqcup \sqcup_{\{j \geq 1\}} D_j = \mathbb{C} \setminus \Omega$  (если ограниченные компоненты  $D_j$  отсутствуют, то  $\widehat{K} = K$ ) называется (топологической, полиномиальной) *оболочкой* компакта  $K$  в  $\mathbb{C}$ .

ТЕОРЕМА 2.2. Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$ ,  $K$  – компакт в  $\mathbb{C}$ . Если  $K \subset D$ , то  $\widehat{K} \subset D$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если ограниченные компоненты  $\mathbb{C} \setminus K$  отсутствуют, то  $\widehat{K} = K \subset D$  и все доказано. В противном случае положим  $U_1 = \bigcup_{\{j \geq 1\}} D_j$  – (ограниченное) непустое открытое множество в  $\mathbb{C}$ , и, значит, в  $(\mathbb{C}^\#, d^\#)$ . Множество  $U_2 = \Omega \cup \{\infty\}$  – тоже непустое открытое множество в  $(\mathbb{C}^\#, d^\#)$ , причем  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ . Ясно, что  $U_1 \sqcup U_2 = \mathbb{C}^\# \setminus K$ .

Пусть, от противного,  $\widehat{K} = K \cup U_1 \not\subset D$ , откуда  $U_1 \not\subset D$  и, следовательно,  $U_1 \cap D_c^\# \neq \emptyset$ . С другой стороны,  $\infty \in U_2 \cap D_c^\# \neq \emptyset$  и  $D_c^\# \subset U_1 \sqcup U_2$ . Получаем, что множество  $D_c^\#$  – несвязно. Противоречие.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 2.1. Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$ ,  $S = [\gamma]$  – носитель замкнутого жорданова пути  $\gamma$ ,  $S \subset D$ . Пусть  $D_\gamma$  – ограниченная компонента  $\mathbb{C} \setminus S$  (см. теорему Жордана). Тогда  $D_\gamma \sqcup [\gamma] = \widehat{S} \subset D$ , т.е.  $D_\gamma \subset D$ .

**3. Лекция 3. Комплексная производная. Производная сложной и обратной функции.  $\mathbb{C}$ - и  $\mathbb{R}$ -дифференцируемость. Теорема Коши - Римана. Свойства производных. Производная по направлению. Голоморфность в точке и области.**

**Комплексная производная.  $\mathbb{C}$ -дифференцируемость в точке. Производная сложной и обратной функции.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1. Пусть (комплекснозначная) функция  $f$  определена в некоторой окрестности точки  $z_0$ . Если существует конечный  $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ , то он называется *комплексной производной функции  $f$  в точке  $z_0$*  и обозначается  $f'(z_0)$ . Функция  $f$  в этом случае называется  *$\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$* , что эквивалентно наличию следующего представления:

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0. \quad (3.1)$$

В качестве примера покажем, что  $\forall z_0 \in \mathbb{C}$  имеем  $(e^z)'|_{z_0} = e^{z_0}$ . Иными словами,  $(e^z)' = e^z$ . Действительно:

$$(e^z)'|_{z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{e^{z_0 + \Delta z} - e^{z_0}}{\Delta z} = e^{z_0} \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta z} - 1}{\Delta z} = e^{z_0}.$$

ТЕОРЕМА 3.1. (О комплексной производной сложной функции). Пусть функция  $g$  имеет комплексную производную в точке  $z_0$ ,  $f$  имеет комплексную производную в точке  $w_0 = g(z_0)$ . Тогда

$$f(g(z))'|_{z_0} = f'(w_0)g'(z_0). \quad (3.2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу  $\mathbb{C}$ -дифференцируемости функций  $g$  и  $f$  в точках  $z_0$  и  $w_0$  соответственно, в некоторой окрестности точки 0 переменных  $\Delta z = z - z_0$  и  $\Delta w = w - w_0$  имеем:

$$\Delta g|_{z_0}(\Delta z) := g(z_0 + \Delta z) - g(z_0) = g'(z_0)\Delta z + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0,$$

$$\Delta f|_{w_0}(\Delta w) := f(w_0 + \Delta w) - f(w_0) = f'(w_0)\Delta w + o(\Delta w), \quad \Delta w \rightarrow 0.$$

Подставляя  $\Delta w = \Delta g|_{z_0}(\Delta z)$  в последнее равенство, получаем:

$$\begin{aligned} \Delta f(g)|_{z_0}(\Delta z) &= f(g(z_0 + \Delta z)) - f(g(z_0)) = f'(w_0)(g'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)) + o(\Delta g|_{z_0}(\Delta z)) = \\ &= f'(w_0)g'(z_0)\Delta z + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0, \end{aligned}$$

что и означает справедливость (3.2). □

ТЕОРЕМА 3.2. (О производной обратной функции). Пусть функция  $f$  гомеоморфно отображает некоторую окрестность  $U(z_0)$  точки  $z_0$  на некоторую окрестность  $V(w_0)$  точки  $w_0$  в  $\mathbb{C}$ , и пусть  $g : V(w_0) \rightarrow U(z_0)$  – обратная к  $f$  функция.

Если существует  $f'(z_0) \neq 0$ , то существует  $g'(w_0) = 1/f'(z_0)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для  $\Delta w \neq 0$  такого, что  $w_0 + \Delta w \in V(w_0)$ , положим  $\Delta z = g(w_0 + \Delta w) - g(w_0)$ . Тогда  $\Delta z \neq 0$ ,  $z_0 + \Delta z \in U(z_0)$ , причем  $\Delta w$  и  $\Delta z$  стремятся к 0 одновременно. Следовательно (провести детальное доказательство центрального равенства!),

$$g'(w_0) = \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \frac{g(w_0 + \Delta w) - g(w_0)}{\Delta w} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)} = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

□

ПРИМЕР 3.1. (Использование теоремы о производной обратной функции). В указанных выше обозначениях (при  $-\infty < \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi < +\infty$ ), пусть  $z_0 \in \Pi_{(\alpha, \beta)}$ ,  $w_0 = e^{z_0} \in V_{(\alpha, \beta)}$ . Тогда

$$\left( \ln w \right)' \Big|_{w_0} = \frac{1}{(e^z)' \Big|_{z_0}} = \frac{1}{e^{z_0}} = \frac{1}{w_0}.$$

Иными словами,  $\left( \ln z \right)' = 1/z$ ,  $z \in V_{(\alpha, \beta)}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 3.1. Доказать, что при  $n \in \{2, 3, \dots\}$  для каждого  $z_0 \in \mathbb{C}$  выполнено равенство  $(z^n)' \Big|_{z=z_0} = nz_0^{n-1}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 3.2. Доказать, что при  $n \in \{2, 3, \dots\}$  и  $-\infty < \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi/n < +\infty$  имеем:

$$\left( \sqrt[n]{w} \right)' = \frac{1}{nw} \sqrt[n]{w}, \quad w \in V_{(n\alpha, n\beta)}.$$

### **$\mathbb{R}$ -дифференцируемость.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2. Функция  $f$ , определенная в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ , называется  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$ , если найдутся комплексные постоянные  $A$  и  $B$  такие, что

$$\Delta f \Big|_{z_0}(\Delta z) := f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta z + B\overline{\Delta z} + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0.$$

В этих условиях  $A$  и  $B$  определены однозначно (проверить), и их обозначают через  $\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0}$  и  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0}$  соответственно. А выражение

$$df \Big|_{z_0}(\Delta z) := \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} \overline{\Delta z}$$

называется *дифференциалом функции  $f$  в точке  $z_0$  с приращением  $\Delta z$* .

Из формулы (3.1) непосредственно следует, что всякая  $\mathbb{C}$ -дифференцируемая в точке  $z_0$  функция  $f$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в этой точке и  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} = 0$ .

ПРИМЕР 3.2. Рассмотрим функцию  $f(z) = \bar{z}^2$ . Тогда

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = (\bar{z}_0 + \overline{\Delta z})^2 - \bar{z}_0^2 = 2\bar{z}_0\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0.$$

Таким образом,  $\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} = 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} = 2\bar{z}_0$  для любого  $z_0 \in \mathbb{C}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3. Функция  $L : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  называется  $\mathbb{C}$ -линейной, если для всех  $z_1, z_2$  и  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$  имеем

$$L(\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2) = \lambda_1 L(z_1) + \lambda_2 L(z_2).$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.1. Функция  $L$  является  $\mathbb{C}$ -линейной  $\Leftrightarrow L(z) = \lambda z$  для некоторого  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Свойство ( $\Leftarrow$ ) очевидно. Докажем ( $\Rightarrow$ ). Положим  $\lambda = L(1)$ . Тогда в силу  $\mathbb{C}$ -линейности имеем  $L(z) = L(z \cdot 1) = z \cdot L(1) = \lambda z$ ,  $z \in \mathbb{C}$ .  $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.4. Функция  $L_1 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  называется  $\mathbb{R}$ -линейной, если для всех  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  и для всех  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  справедливо равенство

$$L_1(\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2) = \lambda_1 L_1(z_1) + \lambda_2 L_1(z_2).$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.2. Функция  $L_1$  является  $\mathbb{R}$ -линейной  $\Leftrightarrow$  найдутся постоянные  $a, b \in \mathbb{C}$  с условием  $L_1(z) = az + b\bar{z}$  для всех  $z \in \mathbb{C}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение  $\Leftarrow$  очевидно.

Докажем  $\Rightarrow$ . Положим  $p = L_1(1)$ ,  $q = L_1(i)$ . Тогда  $\forall z \in \mathbb{C}$  имеем:

$$L_1(z) = L_1(x + iy) = px + qy = p \frac{z + \bar{z}}{2} + q \frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{p - qi}{2} z + \frac{p + qi}{2} \bar{z}.$$

□

Фактически установлено следующее предложение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.3. Справедливы утверждения:

(1) две  $\mathbb{R}$ -линейные формы  $L_j(z) = a_j z + b_j \bar{z}$ ,  $j \in \{1, 2\}$ , совпадают как функции от  $z \Leftrightarrow a_1 = a_2$  и одновременно  $b_1 = b_2$  (т.е. по  $\mathbb{R}$ -линейной форме её коэффициенты  $a$  и  $b$  находятся однозначно);

(2)  $\mathbb{R}$ -линейная форма  $L_1(z) = az + b\bar{z}$  является  $\mathbb{C}$ -линейной  $\Leftrightarrow b = 0$ ;

(3) всякая  $\mathbb{R}$ -линейная форма  $az + b\bar{z}$  представима в виде  $px + qy$  ( $z = x + iy$ ), где постоянные  $p, q \in \mathbb{C}$  определены по  $a$  и  $b$  однозначно.

УПРАЖНЕНИЕ 3.3. При каких  $a$  и  $b$  отображение  $w = az + b\bar{z}$  всякий (открытый) круг переводит в круг?

В частности, если  $f$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$ , то (при  $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ) справедливо равенство  $\Delta f|_{z_0}(\Delta z) = P\Delta x + Q\Delta y + o(\Delta z)$ ,  $\Delta z \rightarrow 0$ .

Естественно обозначить  $P = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{z_0}$ ,  $Q = \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{z_0}$ .

Найдем выражение  $A$  и  $B$  (т.е.  $\frac{\partial f}{\partial z}\Big|_{z_0}$  и  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\Big|_{z_0}$ ) через  $P$  и  $Q$  и обратно:

$$P\Delta x + Q\Delta y = A\Delta z + B\Delta \bar{z} = A(\Delta x + i\Delta y) + B(\Delta x - i\Delta y) = (A+B)\Delta x + i(A-B)\Delta y,$$

откуда  $P = A + B$ ,  $Q = i(A - B)$ , т.е.  $A = \frac{P - iQ}{2}$ ,  $B = \frac{P + iQ}{2}$ . Таким образом, получаем:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = i\left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\right), \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right), \quad (3.4)$$

в точке  $z_0$ .

Далее, пусть  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  ( $u = \operatorname{Re}(f)$ ,  $v = \operatorname{Im}(f)$ ). Ясно, что  $f$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0 = x_0 + iy_0$  если и только если функции  $u$  и  $v$  являются дифференцируемыми в точке  $(x_0, y_0)$  как функции двух переменных. При этом (полагая  $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ) имеем:

$$df|_{z_0}(\Delta z) = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{z_0} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{z_0} \Delta y = (u'_x + iv'_x)|_{z_0} \Delta x + (u'_y + iv'_y)|_{z_0} \Delta y,$$

так что  $\partial f/(\partial x) = u'_x + iv'_x$ ,  $\partial f/(\partial y) = u'_y + iv'_y$ ,

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(u'_x + iv'_x + iu'_y - v'_y) = \frac{1}{2}(u'_x - v'_y) + \frac{i}{2}(v'_x + u'_y) \quad (3.5)$$

в точке  $z_0$ .

ТЕОРЕМА 3.3. (Коши-Римана). Пусть функция  $f$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$ . Тогда  $f$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$  если и только если выполнены следующие эквивалентные условия Коши-Римана:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u'_x|_{z_0} = v'_y|_{z_0} \\ u'_y|_{z_0} = -v'_x|_{z_0} \end{cases} \quad (3.6)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При условии  $\mathbb{R}$ -дифференцируемости в точке  $z_0$  функция  $f$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в этой точке если и только если

$$df \Big|_{z_0}(\Delta z) = \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} \overline{\Delta z}$$

является  $\mathbb{C}$ -линейной формой, что эквивалентно первому из условий в (3.6). Оно, в свою очередь, эквивалентно второму из условий в (3.6), ввиду равенства (3.5).  $\square$

Заметим, что если функция  $f$  является  $\mathbb{R}$ -линейной в  $\mathbb{C}$ , то для каждой точки  $z_0$  полное приращение  $\Delta f \Big|_{z_0}(\Delta z)$  функции  $f$  в точке  $z_0$  совпадает с ее дифференциалом  $df \Big|_{z_0}(\Delta z)$  в этой точке. Так что  $\Delta z = dz$ ,  $\Delta \bar{z} = d\bar{z} = \overline{dz}$  и  $\Delta x = dx$ ,  $\Delta y = dy$  для каждой точки  $z_0$ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.4. Пусть функции  $f$  и  $g$  являются  $\mathbb{R}$ -дифференцируемыми в точке  $z_0$ . Тогда функции  $f \pm g$ ,  $f \cdot g$ ,  $f/g$  (при  $g(z_0) \neq 0$ ) являются  $\mathbb{R}$ -дифференцируемыми в точке  $z_0$  и справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f \pm g)}{\partial z} \Big|_{z_0} &= \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \pm \frac{\partial g}{\partial z} \Big|_{z_0}; & \frac{\partial(f \pm g)}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} &= \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} \pm \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0}; \\ \frac{\partial(fg)}{\partial z} \Big|_{z_0} &= \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} g(z_0) + f(z_0) \frac{\partial g}{\partial z} \Big|_{z_0}; & \frac{\partial(fg)}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} &= \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} g(z_0) + f(z_0) \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0}. \\ \frac{\partial(f/g)}{\partial z} \Big|_{z_0} &= \frac{(\partial f/\partial z)|_{z_0} g(z_0) - f(z_0)(\partial g/\partial z)|_{z_0}}{g^2(z_0)}; \\ \frac{\partial(f/g)}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} &= \frac{(\partial f/\partial \bar{z})|_{z_0} g(z_0) - f(z_0)(\partial g/\partial \bar{z})|_{z_0}}{g^2(z_0)}. \end{aligned}$$

В частности, если  $f$  и  $g$  являются  $\mathbb{C}$ -дифференцируемыми в точке  $z_0$ , то  $f \pm g$ ,  $f \cdot g$ ,  $f/g$  (при  $g(z_0) \neq 0$ ) являются  $\mathbb{C}$ -дифференцируемыми в точке  $z_0$  и верны стандартные формулы для (комплексных) производных суммы, произведения и частного, например  $(f \cdot g)' \Big|_{z_0} = f'(z_0) \cdot g(z_0) + f(z_0) \cdot g'(z_0)$  и  $(f/g)' \Big|_{z_0} = (f'(z_0) \cdot g(z_0) - f(z_0) \cdot g'(z_0))/g^2(z_0)$ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.5. Пусть функция  $g(z)$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$ , а функция  $f(w)$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $w_0 = g(z_0)$ . Тогда сложная функция  $f \circ g(z) = f(g(z))$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$  и выполнены соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f \circ g)}{\partial z} \Big|_{z_0} &= \frac{\partial f}{\partial w} \Big|_{w_0} \cdot \frac{\partial g}{\partial z} \Big|_{z_0} + \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \Big|_{w_0} \cdot \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \Big|_{z_0}, \\ \frac{\partial(f \circ g)}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} &= \frac{\partial f}{\partial w} \Big|_{w_0} \cdot \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} + \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \Big|_{w_0} \cdot \frac{\partial \bar{g}}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0}. \end{aligned}$$

В частности, если  $g$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$  и  $f$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $w_0$ , то функция  $f \circ g$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$  и  $(f \circ g)' \Big|_{z_0} = f'(w_0) \cdot g'(z_0)$ , что было установлено в начале лекции.

Доказательства этих двух предложений остается в качестве упражнений.

### Производная по направлению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5. Пусть функция  $f$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$ ,  $\theta \in (-\pi, \pi]$ . Производной функции  $f$  в точке  $z_0$  по направлению  $\theta$  (точнее, по направлению  $e^{i\theta}$ ) называется величина

$$\frac{\partial f}{\partial z_\theta} \Big|_{z_0} = \lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \arg(\Delta z) = \theta}} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

Нетрудно найти формулу для указанной производной:

$$\frac{\partial f}{\partial z_\theta} \Big|_{z_0} = \lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \arg(\Delta z) = \theta}} \frac{\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} \overline{\Delta z} + o(\Delta z)}{\Delta z} = \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} e^{-2i\theta}$$

поскольку  $\Delta z = |\Delta z|e^{i\theta}$ ,  $\overline{\Delta z} = |\Delta z|e^{-i\theta} = \Delta z e^{-2i\theta}$  при  $\arg(\Delta z) = \theta$ .

При  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} \neq 0$  множество всех производных по направлению  $\left\{ \frac{\partial f}{\partial z_\theta} \Big|_{z_0} \right\}_{\theta \in (-\pi, \pi]}$  дважды пробегает окружность с радиусом  $\left| \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Big|_{z_0} \right|$  и центром в точке  $\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0}$ . Поэтому очевидно, что  $\mathbb{R}$ -дифференцируемая в точке  $z_0$  функция  $f$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в этой точке, если и только если для всех  $\theta \in (-\pi, \pi]$  имеем  $\frac{\partial f}{\partial z_\theta} \Big|_{z_0} = \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0}$ , т.е. все производные по направлению совпадают.

### Ассоциированное отображение.

Пусть  $z = x + iy$  и функция  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  является  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке  $z_0 = x_0 + iy_0$ . Тогда в окрестности точки  $(x_0, y_0)^t \in \mathbb{R}^2$  определено так называемое *ассоциированное отображение*  $F : (x, y)^t \mapsto (u(x, y), v(x, y))^t$ . Если вдруг  $f$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $z_0$ , то по теореме 3.3 в точке  $z_0$  выполняются равенства  $u_x = v_y$ ,  $u_y = -v_x$ , поэтому якобиан ассоциированного отображения в этой точке равен

$$\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \Big|_{z_0} = (u_x v_y - v_x u_y) \Big|_{z_0} = (u_x^2 + v_x^2) \Big|_{z_0} = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{z_0} \right|^2 = |f'(z_0)|^2.$$

Таким образом, квадрат модуля комплексной производной равен якобиану ассоциированного отображения в соответствующей точке. В частности, если якобиан ассоциированного отображения  $\mathbb{R}$ -дифференцируемой функции  $f$  в точке  $z_0$  отрицателен, то функция  $f$  не может быть  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в этой точке.

### Голоморфность в точке и области.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.6. Пусть функция  $f$  определена и  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Тогда  $f$  называется *голоморфной в точке*  $z_0$  (это свойство кратко записывается так:  $f \in \mathcal{A}(z_0)$ ).

Если  $f$  определена и голоморфна в каждой точке некоторой области  $D \subset \mathbb{C}$  (т.е. функция  $f$  является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в каждой точке области  $D$ ), то  $f$  называется *голоморфной в области*  $D$ . Пространство всех функций, голоморфных в области  $D$ , обозначается через  $\mathcal{A}(D)$ .

Функции класса  $\mathcal{A}(\mathbb{C})$  называются *целыми*. Примеры:  $z^{10}$ ,  $e^{z^2}$ .

ПРИМЕР 3.3. Функция  $f(z) = \bar{z}^2$  всюду  $\mathbb{R}$ -дифференцируема. Но  $\mathbb{C}$ -дифференцируема она только в точке  $z_0 = 0$ , поэтому  $f$  нигде не голоморфна.



#### 4. Лекция 4. Конформные отображения. Дробно-линейные отображения и их свойства.

##### Конформные отображения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1.  $\mathbb{R}$ -дифференцируемая в точке  $z_0$  функция  $f$  называется *конформной в точке  $z_0$* , если ее дифференциал в этой точке является композицией гомотетии (с положительным коэффициентом, с центром в нуле) и поворота (с центром в нуле), т.е.

$$df|_{z_0}(\Delta z) = ke^{i\alpha} \Delta z, \quad k > 0, \alpha \in (-\pi, \pi],$$

что эквивалентно условию наличия  $f'(z_0) = ke^{i\alpha} \neq 0$ .

Коэффициент гомотетии  $k = |f'(z_0)|$  и угол поворота  $\alpha = \arg(f'(z_0))$  – составляют *геометрический смысл* производной конформного отображения в точке  $z_0$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2. Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$  и функция  $f$  конформна в каждой точке  $z_0 \in D$ . В этом случае говорят, что  $f$  *локально конформна в области  $D$* .

Функция  $f$  называется *конформной в области  $D$* , если  $f$  локально конформна в  $D$  и взаимно-однозначна в  $D$ .

ПРИМЕР 4.1. (1) функция  $f(z) = e^z$  локально конформна в  $\mathbb{C}$ , поскольку в любой точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  существует отличная от 0 производная  $f'(z_0) = e^{z_0} \neq 0$ ; эта функция конформна, например, в любой полосе  $\Pi_{(\alpha, \beta)}$ ,  $-\infty < \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi < +\infty$ ; полоса  $\Pi_{(-\pi, \pi)}$  называется *стандартной областью конформности* экспоненты;

(2) функция  $f(z) = z^n$ ,  $n \in \{2, 3, \dots\}$ , локально конформна в области  $\mathbb{C}_b = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , конформна в любом угле  $V_{(\alpha, \beta)}$ ,  $-\infty < \alpha < \beta \leq \alpha + \frac{2\pi}{n} < +\infty$ ; угол  $V_{(-\frac{\pi}{n}, \frac{\pi}{n})}$  называется *стандартной областью конформности* указанной функции.

##### Дробно-линейные отображения (ДЛО) и их свойства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3. *Дробно-линейное отображение* – это функция вида

$$w = \Lambda(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \text{где } a, b, c, d \in \mathbb{C}, \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

Доопределим ДЛО до отображения  $\mathbb{C}^\# \rightarrow \mathbb{C}^\#$ . При  $c = 0$  положим  $\Lambda(\infty) = \infty$ . При  $c \neq 0$  положим  $\Lambda(\infty) = \frac{a}{c}$ ,  $\Lambda(-\frac{d}{c}) = \infty$ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.1. *Всякое ДЛО является гомеоморфизмом  $\mathbb{C}^\# \rightarrow \mathbb{C}^\#$ , причем обратное отображение – тоже ДЛО.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непрерывность ДЛО во всех точках, кроме  $-d/c$  (при  $c \neq 0$ ) и  $\infty$ , очевидна. Непрерывность в последних точках легко следует из определения метрики в  $\mathbb{C}^\#$ . Кроме того, непосредственно проверяется, что ДЛО, заданное формулой  $z = \frac{-dw + b}{cw - a}$  обратно к ДЛО  $w = \frac{az + b}{cz + d}$ .  $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.2. *Совокупность всех ДЛО образует группу относительно композиции  $\Lambda_2 \circ \Lambda_1(z) = \Lambda_2(\Lambda_1(z))$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку существование обратного элемента установлено в предыдущем предложении, а единичным элементом, очевидно, является ДЛО  $\Lambda(z) = z = \frac{1 \cdot z + 0}{0 \cdot z + 1}$ , нужно лишь установить, что композиция двух ДЛО – снова ДЛО. Этот факт проверяется непосредственно.  $\square$

Рассмотрим отображение  $\Phi$  из группы  $GL(2, \mathbb{C})$  всех невырожденных  $2 \times 2$ -матриц с коэффициентами из  $\mathbb{C}$  в группу всех ДЛО  $\{\Lambda\}$  по формуле

$$\Phi \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Легко проверяется, что  $\Phi$  – гомоморфизм, т.е.  $\Phi(M_2 M_1)(z) = \Phi(M_2)(\Phi(M_1)(z))$  для всех  $M_1$  и  $M_2$  из  $GL(2, \mathbb{C})$ .

УПРАЖНЕНИЕ 4.1. Какой факторгруппе группы  $SL(2, \mathbb{C})$  изоморфна группа  $\{\Lambda\}$  всех ДЛО? Коммутативна ли группа  $\{\Lambda\}$ ?

*Конформность ДЛО на  $\mathbb{C}^\#$ .*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4. Пусть функция  $f$  отображает некоторую окрестность точки  $z_0 \in \mathbb{C}$  в некоторую окрестность точки  $\infty$  (из  $\mathbb{C}^\#$ ), причем  $f(z_0) = \infty$ . Говорят, что функция  $f$  *конформна в точке  $z_0$* , если отображение  $\tilde{w} = g(z) = 1/f(z)$  (полагаем  $g(z) = 0$  при  $f(z) = \infty$ ) конформно в точке  $z_0$ .

Пусть задана функция  $f$ , отображающая некоторую окрестность точки  $\infty$  (из  $\mathbb{C}^\#$ ) в некоторую окрестность точки  $\infty$  (в  $\mathbb{C}^\#$ ), причем  $f(\infty) = \infty$ . Говорят, что  $f$  *конформна в точке  $\infty$* , если отображение  $\tilde{w} = g(\tilde{z}) = 1/f(1/\tilde{z})$  (полагаем  $g(\tilde{z}) = 0$  при  $f(1/\tilde{z}) = \infty$ ,  $1/0 = \infty$ ) конформно в точке  $\tilde{z} = 0$ .

УПРАЖНЕНИЕ 4.2. Дать определение конформности функции  $f$  в точке  $\infty$  при  $f(\infty) = w_0 \neq \infty$ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.3. *Всякое ДЛО есть конформный изоморфизм  $\mathbb{C}^\#$  на  $\mathbb{C}^\#$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть сначала  $c = 0$ , тогда  $\Lambda(z) = az + b$ , где  $a, b \in \mathbb{C}$ ,  $a \neq 0$ . Отсюда  $\forall z_0 \in \mathbb{C}$  имеем  $\Lambda'(z_0) = a \neq 0$ , т.е.  $\Lambda$  – конформный изоморфизм  $\mathbb{C}$  на  $\mathbb{C}$  (с обратным  $\Lambda^{-1}(w) = (w - b)/a$ ). Остается проверить конформность  $\Lambda$  в точке  $\infty$ , что эквивалентно конформности в точке  $\tilde{z} = 0$  отображения

$$\tilde{w} = \frac{1}{\Lambda(1/\tilde{z})} = \frac{\tilde{z}}{b\tilde{z} + a} = \tilde{\Lambda}(\tilde{z}).$$

Проверяем:  $\tilde{\Lambda}'(0) = \frac{1}{a} \neq 0$ .

Пусть теперь  $c \neq 0$ . Следует рассмотреть три случая:

- (1) при  $z_0 \neq -\frac{d}{c}$  и  $z_0 \neq \infty$  имеем:  $\Lambda'(z_0) = \frac{ad - bc}{(cz_0 + d)^2} \neq 0$ , что и требовалось;
- (2) при  $z_0 = -\frac{d}{c}$  получаем  $\Lambda(z_0) = \infty$ ; рассмотрим самостоятельно;
- (3) случай  $z_0 = \infty$  также оставляем читателю.

□

*Сохранение углов между путями.*

Прежде чем формулировать следующее свойство ДЛО, докажем одно вспомогательное утверждение.

Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь, дифференцируемый в точке  $t_0 \in (\alpha, \beta)$ . Если  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ , то

$$\frac{d}{dt}(\gamma(t))|_{t_0} = \dot{\gamma}(t_0) = \dot{x}(t_0) + i\dot{y}(t_0).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5. Если  $\dot{\gamma}(t_0) \neq 0$ , то  $\dot{\gamma}(t_0)$  называется *касательным вектором к пути  $\gamma$  в точке  $z_0 = \gamma(t_0)$*  (соответствующим параметру  $t_0$ ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6. Пусть  $\gamma_j : [\alpha_j, \beta_j] \rightarrow \mathbb{C}$  ( $j \in \{1, 2\}$ ) – пути,  $t_j \in (\alpha_j, \beta_j)$ ,  $\gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2) = z_0$ . Пусть  $\exists \dot{\gamma}_j(t_j) \neq 0$ ,  $j \in \{1, 2\}$ . Углом между путями  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  в точке  $z_0$  (соответствующим параметрам  $t_1$  и  $t_2$ ) называется направленный угол между касательными векторами  $\dot{\gamma}_1(t_1)$  и  $\dot{\gamma}_2(t_2)$  (вращаем  $\dot{\gamma}_1(t_1)$  в ближайшую сторону до совпадения с  $\dot{\gamma}_2(t_2)$ , учитываем направление вращения, значение угла лежит в пределах  $(-\pi, \pi]$ ).

ЛЕММА 4.1. Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь,  $t_0 \in (\alpha, \beta)$  и существует  $\dot{\gamma}(t_0)$ . Если функция  $f$  непрерывна в окрестности точки  $z_0 = \gamma(t_0)$  и  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z_0$ , то в некоторой окрестности точки  $t_0$  определен путь  $\sigma(t) = f(\gamma(t))$ , причем

$$\dot{\sigma}(t_0) = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t_0} = f'(z_0) \dot{\gamma}(t_0). \quad (4.1)$$

В частности, если  $\dot{\gamma}(t_0) \neq 0$  и  $f'(z_0) \neq 0$ , то  $\dot{\sigma}(t_0) \neq 0$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку  $\gamma$  – путь, а функция  $f$  непрерывна в окрестности  $z_0 = \gamma(t_0)$ , композиция  $f \circ \gamma$  является путем (непрерывна) в окрестности точки  $t_0$ . Поскольку путь  $\gamma$  дифференцируем в точке  $t_0$ , имеем  $\Delta\gamma|_{t_0}(\Delta t) = \dot{\gamma}(t_0)\Delta t + o(\Delta t)$  при  $\Delta t \rightarrow 0$ . Наконец, в силу  $\mathbb{C}$ -дифференцируемости функции  $f$  в точке  $z_0$  справедливо представление:

$$\begin{aligned} \Delta(f \circ \gamma)|_{t_0}(\Delta t) &= f \circ \gamma(t_0 + \Delta t) - f \circ \gamma(t_0) = f(\gamma(t_0) + \Delta\gamma|_{t_0}(\Delta t)) - f(\gamma(t_0)) = \\ &= f'(z_0)\Delta\gamma|_{t_0}(\Delta t) + o(\Delta\gamma|_{t_0}(\Delta t)) = f'(z_0)\dot{\gamma}(t_0)\Delta t + o(\Delta t), \quad \Delta t \rightarrow 0, \end{aligned}$$

что и означает справедливость (4.1).  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 4.1.1. Пусть  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  – пути, дифференцируемые в точках  $t_1$  и  $t_2$  соответственно, причем  $\gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2) = z_0$ ,  $\dot{\gamma}_1(t_1) \neq 0$ ,  $\dot{\gamma}_2(t_2) \neq 0$ . Пусть функция  $f$  непрерывна в окрестности точки  $z_0$  и  $\exists f'(z_0) \neq 0$ . Тогда угол между путями  $f \circ \gamma_1$  и  $f \circ \gamma_2$  в точке  $f(z_0)$  равен углу между путями  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  в точке  $z_0$  (соответственно параметрам  $t_1$  и  $t_2$ ).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По лемме 4.1,  $(f \circ \gamma_j)'(t_j) = f'(z_0)\dot{\gamma}_j(t_j)$ ,  $j \in \{1, 2\}$ , т.е. оба касательных вектора умножаются на одно и то же ненулевое комплексное число  $f'(z_0)$ . Поскольку это равносильно композиции растяжения и поворота, угол между касательными векторами сохраняется с учетом направления.  $\square$

*Круговое свойство.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.7. Обобщенной окружностью в  $\mathbb{C}^\#$  называется обычная окружность в  $\mathbb{C}$  либо прямая в  $\mathbb{C}$ , дополненная точкой  $\infty$ .

ЛЕММА 4.2. Всякая обобщенная окружность в  $\mathbb{C}^\#$  (её часть в  $\mathbb{C}$ ) задается уравнением

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{C}, |B|^2 > AC. \quad (4.2)$$

Обратно, всякое такое уравнение с указанными условиями на постоянные параметры задает обобщенную окружность в  $\mathbb{C}^\#$  (точнее – её часть в  $\mathbb{C}$ ), т.е. окружность или прямую.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Всякая окружность в  $\mathbb{C}$  задается уравнением

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 - R^2 = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}, R > 0.$$

Преобразуем левую часть этого уравнения, выразив  $x$  и  $y$  через  $z$  и  $\bar{z}$  ( $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$ ,  $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ ):

$$\begin{aligned} (x - a)^2 + (y - b)^2 - R^2 &= x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = \\ &= |z|^2 - 2a \frac{z + \bar{z}}{2} - 2b \frac{z - \bar{z}}{2i} + C = z\bar{z} + (-a + bi)z + (-a - bi)\bar{z} + C = \\ &= z\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C, \end{aligned}$$

где  $A = 1$ ,  $C = a^2 + b^2 - R^2$ ,  $B = -a - bi$ . Таким образом, уравнение окружности имеет нужный вид (очевидно, что  $|B|^2 > AC$ ).

Случай прямой в  $\mathbb{C}$  оставляем читателю.

Чтобы доказать, что любое уравнение вида (4.2) задает обобщенную окружность (её часть в  $\mathbb{C}$ ), достаточно подставить в (4.2) выражения  $z$  и  $\bar{z}$  через  $x$  и  $y$  (проверить!).  $\square$

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.4.** *Всякое ДЛО отображает обобщенную окружность на обобщенную окружность.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим два случая. Пусть сначала  $c = 0$ ; тогда  $a \neq 0$  и  $d \neq 0$  (без ограничения общности, положим  $d = 1$ ). Пусть  $k = |a|$ ,  $\alpha = \arg(a)$ , тогда  $\Lambda(z) = ke^{i\alpha}(z + b/a)$  есть последовательная композиция сдвига (параллельного переноса на вектор  $b/a$ ), поворота на угол  $\alpha$  и гомотетии с коэффициентом  $k > 0$ . Каждое из этих отображений, очевидно, окружности переводит в окружности и прямые в прямые. Точка  $\infty$  неподвижна.

Пусть теперь  $c \neq 0$ ,  $z_0 = -d/c$ . Тогда

$$\Lambda(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a(z - z_0) + \tilde{b}}{c(z - z_0)} = A + \frac{B}{z - z_0},$$

где  $\tilde{b}$ ,  $A$ ,  $B$  – постоянные в  $\mathbb{C}$ ,  $B = |B|e^{i\alpha} \neq 0$ . Поскольку гомотетия, поворот и сдвиги сохраняют обобщенные окружности, остается доказать, что отображение  $z \mapsto 1/z$  переводит обобщенные окружности в обобщенные окружности.

Напомним, что всякая обобщенная окружность задается уравнением (4.2). Подставим в него  $z = 1/w$ ; получим

$$Cw\bar{w} + Bw + \bar{B}\bar{w} + A = 0,$$

т.е. снова уравнение вида (4.2) при  $A' = C$ ,  $B' = \bar{B}$ ,  $C' = A$  с условиями  $|B'|^2 > A'C'$ . Для завершения доказательства кругового свойства остается еще отдельно рассмотреть случаи, когда точки  $z = 0$  и  $z = \infty$  лежат на исходной обобщенной окружности.  $\square$

*Сохранение симметрии относительно обобщенной окружности.*

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.8.** Пусть  $S$  – окружность в  $\mathbb{C}$  с центром  $a$ ,  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq a$ . Точка  $z^*$  на луче  $az$  называется *симметричной точке  $z$  относительно  $S$* , если  $|z - a| \cdot |z^* - a| = r^2$ . Кроме того, считается, что  $a^* = \infty$ ,  $\infty^* = a$ .

Точки, симметричные относительно прямой, определяются как обычно.

**ПРИМЕР 4.2.** Пусть  $S = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  – единичная окружность с центром в нуле,  $z \neq 0$ . Тогда  $z^* = \frac{1}{\bar{z}}$ . Действительно,  $\arg \frac{1}{\bar{z}} = \arg z$ ,  $|z| \cdot \left|\frac{1}{\bar{z}}\right| = 1$ .

**ЛЕММА 4.3.** *Точки  $z$  и  $z^* \neq z$  (т.е. не лежащие на  $S$ ) симметричны относительно обобщенной окружности  $S$  если и только если всякая обобщенная окружность  $\Gamma$ , проходящая через  $z$  и  $z^*$ , перпендикулярна  $S$ .*

УПРАЖНЕНИЕ 4.3. Доказать лемму 4.3, используя школьную теорему о секущей и касательной.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.5. Пусть  $z$  и  $z^*$  – точки, симметричные относительно обобщенной окружности  $S$ ,  $\Lambda$  – произвольное ДЛО. Тогда  $\Lambda(z)$  и  $\Lambda(z^*)$  симметричны относительно  $\Lambda(S)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если  $z = z^*$ , то утверждение справедливо. Далее считаем, что  $z \neq z^*$ . Пусть  $\Gamma$  – произвольная обобщенная окружность, проходящая через  $\Lambda(z)$  и  $\Lambda(z^*)$ . Согласно предложению 4.4,  $\Lambda^{-1}(\Gamma)$  – обобщенная окружность, проходящая через точки  $z$  и  $z^*$ . Согласно лемме 4.3,  $\Lambda^{-1}(\Gamma) \perp S$ . По следствию 4.1.1,  $\Gamma \perp \Lambda(S)$ . Таким образом, мы получили, что всякая обобщенная окружность, проходящая через  $\Lambda(z)$  и  $\Lambda(z^*)$ , ортогональна  $\Lambda(S)$ . Остается снова применить лемму 4.3.  $\square$

*Свойство трех точек. Сохранение сложного отношения.*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.6. Пусть дана тройка попарно различных точек  $z_1, z_2, z_3$  в  $\mathbb{C}^\sharp$  и ещё тройка попарно различных точек  $w_1, w_2, w_3$  в  $\mathbb{C}^\sharp$ . Тогда существует единственное ДЛО  $\Lambda$  такое, что  $\Lambda(z_j) = w_j$ ,  $j \in \{1, 2, 3\}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\zeta_1 = 0$ ,  $\zeta_2 = \infty$ ,  $\zeta_3 = 1$ , а точки  $z_1, z_2, z_3$  лежат в  $\mathbb{C}$ . Определим

$$\Lambda_{z_1, z_2, z_3}(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}.$$

В случае, когда (ровно) одна из точек  $z_1, z_2, z_3$  равна  $\infty$ , определение модифицируется естественным образом; например, если  $z_1 = \infty$ , то  $\Lambda_{\infty, z_2, z_3} = \frac{z_3 - z_2}{z - z_2}$ .

Ясно, что  $\Lambda_{z_1, z_2, z_3}(z_j) = \zeta_j$ ,  $j \in \{1, 2, 3\}$ .

Искомое ДЛО  $\Lambda = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}^{w_1, w_2, w_3} = (\Lambda_{w_1, w_2, w_3})^{-1} \circ \Lambda_{z_1, z_2, z_3}$  обладает нужными свойствами:  $\Lambda(z_j) = w_j$ ,  $j \in \{1, 2, 3\}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 4.4. Доказать, что  $\Lambda = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}^{w_1, w_2, w_3}$  – единственное ДЛО со свойствами  $\Lambda(z_j) = w_j$ ,  $j \in \{1, 2, 3\}$ .  $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.9. Сложным (ангармоническим) отношением четырех различных точек  $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}^\sharp$  называется величина

$$[z_1, z_2, z_3, z_4] = \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}(z_4).$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.7. Всякое ДЛО сохраняет сложное отношение любых четырех (различных) точек.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\Lambda$  – произвольное ДЛО,  $z_1, z_2, z_3, z_4$  – произвольные различные точки в  $\mathbb{C}^\sharp$ . Пусть  $w_j = \Lambda(z_j)$ ,  $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ . В обозначениях предыдущего предложения, нужно доказать, что  $\Lambda_{w_1, w_2, w_3}(w_4) = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}(z_4)$ .

По предыдущему предложению, единственное ДЛО, переводящее тройку  $(z_1, z_2, z_3)$  в тройку  $(w_1, w_2, w_3)$  имеет вид  $(\Lambda_{w_1, w_2, w_3})^{-1} \circ \Lambda_{z_1, z_2, z_3}$ . Но ДЛО  $\Lambda$  тоже переводит тройку  $(z_1, z_2, z_3)$  в тройку  $(w_1, w_2, w_3)$ . Следовательно,

$$\Lambda = (\Lambda_{w_1, w_2, w_3})^{-1} \circ \Lambda_{z_1, z_2, z_3} \Leftrightarrow \Lambda_{w_1, w_2, w_3} \circ \Lambda = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}.$$

В частности,  $\Lambda_{w_1, w_2, w_3} \circ \Lambda(z_4) = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}(z_4)$ , т.е.  $\Lambda_{w_1, w_2, w_3}(w_4) = \Lambda_{z_1, z_2, z_3}(z_4)$ , что и требовалось.  $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 4.5. Доказать, что четыре различные точки  $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}^\sharp$  лежат на одной обобщенной окружности если и только если  $[z_1, z_2, z_3, z_4] \in \mathbb{R}$ .

**5. Лекция 5. Группы ДЛО-автоморфизмов  $B_1, \Pi_+, \mathbb{C}$ . Функция Жуковского. Тригонометрические функции. Многозначные функции и их однозначные ветви.**

**Группы ДЛО-автоморфизмов  $B_1, \Pi_+, \mathbb{C}$ .**

Обозначим через  $B_1$  открытый круг с радиусом 1 и центром в нуле.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.1.** *Группа ДЛО-автоморфизмов  $B_1$  – это совокупность всех ДЛО вида*

$$\Lambda(z) = e^{i\theta} \cdot \frac{z - a}{\bar{a}z - 1}, \quad \theta \in (-\pi, \pi], a \in B_1. \quad (5.1)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть ДЛО  $\Lambda$  является автоморфизмом  $B_1$  на себя и точка  $a \in B_1$  такова, что  $\Lambda(a) = 0$ . По предложению 4.5 точка  $a^*$ , симметричная точке  $a$  относительно  $\partial B_1$ , перейдет в точку  $\infty$ , симметричную точке 0 относительно  $\Lambda(\partial B_1) = \partial B_1$ . Если  $a = 0$ , то  $\Lambda(z) = k_1 z = k \cdot \frac{z - a}{\bar{a}z - 1}$  для некоторого  $k \in \mathbb{C}$ . Если  $a \neq 0$ , то  $\Lambda(z) = k_2 \cdot \frac{z - a}{z - 1/\bar{a}} = k \cdot \frac{z - a}{\bar{a}z - 1}$ . Поскольку  $|\Lambda(1)| = 1$  и  $|1 - a| = |1 - \bar{a}|$ , имеем  $1 = |k| \cdot \left| \frac{1 - a}{\bar{a} - 1} \right| = |k|$ , откуда  $k = e^{i\theta}$  для некоторого  $\theta \in (-\pi, \pi]$ . Таким образом, любой ДЛО-автоморфизм  $B_1$  имеет вид (5.1).

Покажем, что любое ДЛО вида (5.1) является автоморфизмом  $B_1$  на себя. Поскольку точки  $0 = \Lambda(a)$  и  $\infty = \Lambda\left(\frac{1}{\bar{a}}\right)$  должны быть симметричны относительно  $\Lambda(\partial B_1)$ , то  $\Lambda(\partial B_1)$  является окружностью с центром в нуле. Так как  $|\Lambda(1)| = 1$ , то  $\Lambda(\partial B_1) = \partial B_1$ . Теперь, поскольку  $\Lambda(a) = 0$  и всякое ДЛО есть гомеоморфизм  $\mathbb{C}^\#$  на  $\mathbb{C}^\#$ , нетрудно показать, что  $B_1$  отображается на  $B_1$ .  $\square$

Пусть  $\Pi_+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0\}$  – верхняя полуплоскость.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.2.** *Группа ДЛО-автоморфизмов  $\Pi_+$  – это совокупность всех ДЛО вида*

$$\Lambda(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} > 0. \quad (5.2)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\Lambda$  – ДЛО-автоморфизм  $\Pi_+$  на  $\Pi_+$ . Тогда вещественная прямая  $\mathbb{R}$  переходит в себя. Очевидно, что найдутся три различные точки  $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ , такие, что  $u_1 = \Lambda(x_1), u_2 = \Lambda(x_2), u_3 = \Lambda(x_3) \in \mathbb{R}$ . Согласно предложению 4.6, отображение  $w = \Lambda(z)$  определяется равенством

$$\frac{z - x_1}{z - x_2} : \frac{x_3 - x_1}{x_3 - x_2} = \frac{w - u_1}{w - u_2} : \frac{u_3 - u_1}{u_3 - u_2},$$

откуда легко следует, что

$$\Lambda(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

Далее, поскольку  $\Lambda(i) \in \Pi_+$ , имеем:

$$\operatorname{Im} \Lambda(i) = \operatorname{Im} \frac{ai + b}{ci + d} = \operatorname{Im} \frac{(ai + b)(d - ci)}{(d + ci)(d - ci)} = \frac{ad - bc}{c^2 + d^2} > 0,$$

откуда  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} > 0$ .

Обратно: любое ДЛО вида (5.2) переводит  $\mathbb{R}$  на себя, а точку  $i$  в  $\Pi_+$ . Остается воспользоваться тем, что всякое ДЛО – гомеоморфизм  $\mathbb{C}^\#$  на себя.  $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 5.1. Доказать, что группа ДЛО-автоморфизмов  $\mathbb{C}$  – это совокупность всех ДЛО вида  $\Lambda(z) = az + b$ , где  $a, b \in \mathbb{C}$  и  $a \neq 0$ .

### Функция Жуковского.

Определим функцию Жуковского:

$$\mathcal{J}(z) = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \mathcal{J} \left( \frac{1}{z} \right).$$

Так как её производная имеет вид

$$\mathcal{J}'(z) = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{z^2} \right),$$

то функция  $\mathcal{J}$  является локально конформной в  $\mathbb{C} \setminus \{\pm 1, 0\}$ . На самом деле функция  $\mathcal{J}$  конформна и в точках  $z = 0$  и  $z = \infty$  (проверить по определению).

Определим функции  $\Lambda_1(z) = \frac{z-1}{z+1}$  и  $S(z) = z^2$ . Непосредственно проверяется, что  $\Lambda_1^{-1}(z) = \frac{z+1}{-z+1}$  и  $\mathcal{J} = \Lambda_1^{-1} \circ S \circ \Lambda_1$  (композиция всегда действует справа налево).

Найдем некоторые *максимальные области конформности* функции  $\mathcal{J}$ , т.е. такие области конформности, которые не содержатся ни в каких бóльших областях конформности (для функции  $\mathcal{J}$ ).

Пусть  $D_1 = \mathbb{C}^{\#} \setminus \bar{B}_1$ . На рисунке 5.1 показано: как преобразуется эта область при последовательном применении отображений  $\Lambda$ ,  $S$ ,  $\Lambda^{-1}$ . Ясно, что  $D_1$  является областью конформности. Ее нельзя увеличить, поскольку  $\mathcal{J}(z) = \mathcal{J} \left( \frac{1}{z} \right)$ . Положим  $\Omega_1 = \mathcal{J}(D_1)$ . Обратное к  $\mathcal{J}$  отображение, переводящее  $\Omega_1$  в  $D_1$ , обозначается  $\mathcal{J}_o^{-1}$ .

ЗАМЕЧАНИЕ. Открытый круг  $B_1$  тоже является максимальной областью конформности  $\mathcal{J}$ . Аналогично можно определить обратное к функции  $\mathcal{J}$  отображение  $\mathcal{J}_i^{-1}$ , переводящее область  $\Omega_1$  в  $B_1$ .

Две другие *основные* максимальные области конформности функции Жуковского – верхняя и нижняя полуплоскости. На рисунке 5.2 представлено преобразование области  $D_2 = \Pi_+$  под последовательным действием функций  $\Lambda_1$ ,  $S$ ,  $\Lambda_1^{-1}$ . В частности,  $\Omega_2 = \mathcal{J}(D_2) = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$ .

Обратное отображение из  $\Omega_2$  в  $D_2$  обозначается  $\mathcal{J}_+^{-1}$ . Аналогично определяется функция  $\mathcal{J}_-^{-1}$ , конформно отображающая  $\Omega_2$  на полуплоскость  $\Pi_-$ .

### Тригонометрические функции.

Тригонометрические и гиперболические функции комплексного переменного определяются через экспоненту:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}; \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}; \quad \operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}; \quad \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z};$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}; \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}; \quad \operatorname{tanh} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}; \quad \operatorname{cth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}.$$

УПРАЖНЕНИЕ 5.2. Найти точки  $z \in \mathbb{C}$ , для которых  $\sin z = 0$  или  $\cos z = 0$ .




Рис. 5.1.




Рис. 5.2.

УПРАЖНЕНИЕ 5.3. Доказать, что для всех  $z \in \mathbb{C}$  верны тождества  $\sin z = \cos(\pi/2 - z)$  и  $\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$ .






Рис. 5.3.

Найдем одну из *максимальных областей конформности* отображения  $w = \cos z$ . В силу равенства  $\cos z = \mathcal{Z}(e^{iz})$  и четности функции  $\cos z$ , одна из возможных таких областей – вертикальная полоса  $\Pi'_{(0, \pi)} = \{0 < \text{Re } z < \pi\}$ . В этой полосе конформность функции  $\cos z$  действительно имеет место, поскольку функция  $w_1 = e^{z_1}$  конформна в полосе  $\{0 < \text{Im } z_1 < \pi\}$ , а функция  $w = \mathcal{Z}(w_1)$  конформна в  $\Pi_+$ . Образ области  $\Pi'_{(0, \pi)}$  при отображении  $w = \cos z$  и определение функции  $z = \arccos w$  приведены на рисунке 5.3.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.4.** Пользуясь формулой  $\sin z = \cos(\pi/2 - z)$ , найти образ вертикальной полосы  $\Pi'_{(-\pi/2, \pi/2)}$  при отображении  $w = \sin z$ . Проследить за соответствием границ.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.** Определим многозначные функции, обратные к функциям  $\cos z$  и  $\sin z$  соответственно:

$$z \in \text{Arccos } w \Leftrightarrow w = \cos z; \quad z \in \text{Arcsin } w \Leftrightarrow w = \sin z.$$

Чтобы найти максимальную область конформности функции  $w = \text{tg } z$ , преобразуем эту функцию:

$$\text{tg } z = \frac{\sin z}{\cos z} = -i \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = -i \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1} = -i \Lambda_1(e^{2iz}),$$

где  $\Lambda_1(z) = \frac{z - 1}{z + 1}$ .

Одна из максимальных областей конформности функции  $\text{tg}(z)$  – вертикальная полоса  $\Pi'_{(-\pi/2, \pi/2)}$ . Ее образ  $\Omega_3$  при отображении  $w = \text{tg } z$  и определение функции  $w = \text{arctg } z$  приведены на рисунке 5.4.




Рис. 5.4.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2.** Определим многозначные функции, обратные к функциям  $\operatorname{tg} z$  и  $\operatorname{ctg} z$  соответственно:

$$z \in \operatorname{Arctg} w \Leftrightarrow w = \operatorname{tg} z; \quad z \in \operatorname{Arctctg} w \Leftrightarrow w = \operatorname{ctg} z.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 5.5.** Доказать, что вертикальная полоса  $\Pi'_{(0,\pi)}$  является максимальной областью конформности функции  $\operatorname{ctg} z$ . Определить функцию  $\operatorname{arctg} w$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 5.6.** Найти образ вертикальной полосы  $\Pi'_{(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})}$  при отображении  $w = \operatorname{tg} z$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 5.7.** Доказать, что  $(\operatorname{arctg} z)' = \frac{1}{1+z^2}$  на  $\Omega_3$ .

### Многозначные функции и их однозначные ветви.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3.** Пусть  $E \subseteq \mathbb{C}^\sharp$ ,  $E \neq \emptyset$ . Пусть  $F$  сопоставляет каждой точке  $z \in E$  непустое множество  $F(z) \subseteq \mathbb{C}^\sharp$ . Тогда говорят, что на  $E$  задана *многозначная функция (м-функция)  $F$* .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4.** Пусть  $F$  – м-функция на  $E$ ,  $E_1 \subset E$ ,  $E_1 \neq \emptyset$ . Пусть  $f_1 : E_1 \rightarrow \mathbb{C}^\sharp$  – функция, такая, что  $f_1(z) \in F(z)$  для всех  $z \in E_1$ . Тогда  $f_1$  называется *однозначной ветвью* м-функции  $F$  на  $E_1$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Если функция  $f_1$  из определения 5.4 непрерывна на  $E_1$  (или голоморфна, или конформна в области  $E_1$ ), то  $f_1$  называется *непрерывной (или голоморфной, или конформной) ветвью* м-функции  $F$  на  $E_1$  (без добавления слова "однозначной", что здесь всегда подразумевается).

ПРИМЕР 5.1. (1)  $\text{Ln}(z)$  – м-функция на множестве  $E = \mathbb{C}_b$ ; для всякого  $\alpha \in \mathbb{R}$  функция  $\text{ln}_{(\alpha, \alpha+2\pi)}(z)$  является её конформной (и голоморфной) ветвью на  $V_{(\alpha, \alpha+2\pi)}$ .

(2)  $F(z) = \sqrt[n]{z}$  – м-функция на множестве  $E = \mathbb{C}^\#$  (полагаем  $\sqrt[n]{\infty} := \infty$ ). При любом  $\alpha \in \mathbb{R}$  функция  $\sqrt[n]{z}_{(\alpha, \alpha+2\pi)}$  на  $V_{(\alpha, \alpha+2\pi)}$  – её конформная (и голоморфная) ветвь (см. конец Лекции 1, примеры 3.1 и 4.1, упражнение 3.2).

УПРАЖНЕНИЕ 5.8. М-функция  $F(z) = \text{Arctg}(z)$  определена на множестве  $\mathbb{C}^\# \setminus \{\pm i\}$ . Напомним, что функция  $\text{tg}(z)$  принимает все значения из  $\mathbb{C}^\# \setminus \{\pm i\}$  (в точках  $z_k = \pi/2 + \pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , доопределяем её по непрерывности:  $\text{tg } z_k = \infty$ ). Функция  $f_1(z) = \text{arctg } z$  – голоморфная ветвь м-функции  $\text{Arctg}(z)$  на множестве  $E_1 = \Omega_3$  (см. рис. 5.4).

ПРИМЕР 5.2. М-функция  $\text{Arg}(z)$  определена на множестве  $\mathbb{C}_b = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Функция  $f_1(z) = \text{arg } z$  – непрерывная ветвь м-функции  $\text{Arg}(z)$  на множестве  $E_1 = \mathbb{C}_- := \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ . Однако очевидно, что  $f_1$  не является голоморфной ветвью м-функции  $\text{Arg}(z)$ .

### 5.1. Функции $z^p$ и $a^z$ .

Зафиксируем  $p \in \mathbb{C}$  и определим м-функцию

$$z^p = e^{p \text{Ln } z} = \{ e^{p w_k} \mid w_k \in \text{Ln } z \}, \quad z \in \mathbb{C}_b.$$

При этом функция  $f_1(z) = z^p_{(o)} = e^{p \text{ln } z}$  – голоморфная ветвь  $z^p$  в  $\mathbb{C}_-$ .

УПРАЖНЕНИЕ 5.9. Найти  $i^i$ .

УПРАЖНЕНИЕ 5.10. Найти какую-либо максимальную область конформности функции  $z^i_{(o)}$ .

Пусть теперь фиксировано  $a \in \mathbb{C}$ ,  $a \neq 0$ . По определению положим

$$a^z = e^{z \text{Ln } a} = \{ e^{z w_k} \mid w_k \in \text{Ln } a \}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Тогда  $a^z_{(o)} = e^{z \text{ln } a} \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$  – целая ветвь м-функции  $a^z$ . При этом

$$a^z = e^{z \text{Ln } a} = e^{z(\ln |a| + i(\arg a + 2\pi k))} = e^{z \ln |a|} e^{2\pi k i z} = a^z_{(o)} e^{2\pi k i z}.$$

Таким образом, м-функция  $a^z$  "распадается" на счетное число целых ветвей.

**6. Лекция 6. Непрерывная ветвь м-функции  $\text{Arg}(z)$  вдоль пути. Индекс пути относительно точки. Эквивалентные пути. Действия с кривыми. Спрямоаемые пути и кривые. Интеграл вдоль кривой по комплексной переменной**

**Непрерывная ветвь м-функции  $\text{Arg}(z)$  вдоль пути.**

**ТЕОРЕМА 6.1.** Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}_b = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  – путь. Тогда м-функция  $F(t) = \text{Arg}(\gamma(t))$  имеет непрерывную ветвь  $\varphi_0(t)$  на всем  $[\alpha, \beta]$ .

Все непрерывные на  $[\alpha, \beta]$  ветви м-функции  $F$  имеют вид  $\varphi_k(t) = \varphi_0(t) + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Положим  $\mathbb{C}_- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ ,  $\mathbb{C}_+ = \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ . Докажем существование хотя бы одной непрерывной ветви м-функции  $F$  на всем  $[\alpha, \beta]$ .

Пусть сначала  $[\gamma] = \gamma([\alpha, \beta]) \subset \mathbb{C}_-$ . Тогда можно положить  $\varphi_0(t) = \arg \gamma(t)$  на  $[\alpha, \beta]$ . Аналогично, если  $[\gamma] \subset \mathbb{C}_+$ , то можно положить  $\varphi_0(t) = \arg_{(0, 2\pi)} \gamma(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ .

В общем случае разобьем отрезок  $I = [\alpha, \beta]$  на  $N$  ( $N \in \mathbb{N}$ ) равных последовательных отрезков  $I_n = [\alpha_{n-1}, \alpha_n]$  (где  $\alpha = \alpha_0 < \dots < \alpha_N = \beta$ ) так, чтобы  $[\gamma|_{I_n}]$  целиком содержался в  $\mathbb{C}_+$  или в  $\mathbb{C}_-$  для каждого  $n \in \{1, \dots, N\}$ . Поясним, почему такое разбиение существует. Поскольку  $[\gamma]$  – компакт в  $\mathbb{C}$ , не содержащий точку 0, имеем  $d(0, [\gamma]) = \rho > 0$ . В силу равномерной непрерывности  $\gamma$  на  $I$ , существует такое  $\varepsilon > 0$ , что  $|\gamma(t_1) - \gamma(t_2)| < \rho$  для любых  $t_1, t_2$  из  $I$  с условием  $|t_1 - t_2| < \varepsilon$ . Остается для этого  $\varepsilon$  найти натуральное  $N$  с условием  $(\beta - \alpha)/N < \varepsilon$ .

Пусть  $\psi_n(t) = \arg \gamma(t)|_{I_n}$  при  $[\gamma(t)|_{I_n}] \subset \mathbb{C}_-$ , и  $\psi_n(t) = \arg_{(0, 2\pi)} \gamma(t)|_{I_n}$  в противном случае (при этом  $[\gamma(t)|_{I_n}] \subset \mathbb{C}_+$ ),  $n \in \{1, \dots, N\}$ .

Положим  $\varphi_0(t) = \psi_1(t)$  на  $I_1$ . Тогда  $\psi_2(\alpha_1) = \varphi_0(\alpha_1) + 2\pi k_1$  для некоторого  $k_1 \in \mathbb{Z}$ . Положим  $\varphi_0(t) = \psi_2(t) - 2\pi k_1$  на  $I_2$ . Тогда  $\psi_3(\alpha_2) = \varphi_0(\alpha_2) + 2\pi k_2$  для некоторого  $k_2 \in \mathbb{Z}$ . Положим  $\varphi_0(t) = \psi_3(t) - 2\pi k_2$  на  $I_3$  и т.д. По построению, функция  $\varphi_0(t)$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$  и  $\forall t \in [\alpha, \beta]$  имеем  $\varphi_0(t) \in \text{Arg}(\gamma(t))$ , т.е.  $\varphi_0$  – непрерывная ветвь м-функции  $\text{Arg}(\gamma(t))$  на  $[\alpha, \beta]$ .

Пусть теперь  $\varphi$  – еще одна непрерывная ветвь м-функции  $\text{Arg}(\gamma(t))$  на  $[\alpha, \beta]$ . Тогда  $\psi(t) = \frac{\varphi(t) - \varphi_0(t)}{2\pi}$  – непрерывная на  $[\alpha, \beta]$  функция, принимающая во всех точках целочисленные значения, и, следовательно,  $\psi(t) \equiv k$  на  $[\alpha, \beta]$  для некоторого  $k \in \mathbb{Z}$ . Отсюда получаем  $\varphi(t) \equiv \varphi_0(t) + 2\pi k$ . С другой стороны, очевидно, что все функции вида  $\varphi_k(t) = \varphi_0(t) + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , являются непрерывными ветвями м-функции  $\text{Arg}(\gamma(t))$  на  $[\alpha, \beta]$ .  $\square$

**Индекс пути относительно точки.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.** Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}_b$  – путь и  $\varphi$  – какая-либо непрерывная на  $[\alpha, \beta]$  ветвь м-функции  $\text{Arg}(\gamma(t))$ . Величина

$$\Delta_\gamma \text{Arg}(z) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha)$$

называется *приращением (полярного) аргумента* вдоль пути  $\gamma$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Из теоремы 6.1 следует, что  $\Delta_\gamma \text{Arg}(z)$  определено корректно, т.е. не зависит от выбора непрерывной ветви  $\varphi$  м-функции  $\text{Arg}(\gamma(t))$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2.** Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь, и пусть  $a \notin [\gamma]$ . Тогда путь  $\gamma_{-a}(t) = \gamma(t) - a$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ , не проходит через точку 0 и определен *индексом пути  $\gamma$  относительно точки  $a$* :

$$\text{ind}_\gamma(a) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma_{-a}} \text{Arg}(z).$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Функция  $f(z) = \text{ind}_\gamma(z)$  непрерывна в  $\mathbb{C} \setminus [\gamma]$ . Для доказательства этого факта достаточно разбить путь  $\gamma$  на "маленькие" пути (как это сделано в доказательстве теоремы 6.1) и установить нужный факт для каждого из этих путей.

В случае замкнутого пути  $\gamma$  функция  $f(z)$  постоянна (и целочисленна) в каждой компоненте связности множества  $\mathbb{C} \setminus [\gamma]$ .

Следующая теорема будет доказана в разделе "Спецкурс" после доказательства теоремы Жордана.

ТЕОРЕМА 6.2. Пусть  $\gamma$  – замкнутый жорданов путь в  $\mathbb{C}$ . По теореме Жордана,  $\mathbb{C} \setminus [\gamma] = D \sqcup \Omega$ , где  $D$  – ограниченная компонента  $\mathbb{C} \setminus [\gamma]$ ,  $\Omega$  – неограниченная. Тогда утверждается, что  $\text{ind}_\gamma(z) \equiv 0$  для всех  $z \in \Omega$ ,  $\text{ind}_\gamma(z) \equiv 1$  (или  $\text{ind}_\gamma(z) \equiv -1$ ) для всех  $z \in D$ .

В случае, когда  $\text{ind}_\gamma(z) \equiv 1$  для всех  $z \in D$ , путь  $\gamma$  называется *положительно ориентированным относительно области  $D$* . Если же  $\text{ind}_\gamma(z) \equiv -1$  для всех  $z \in D$ , то  $\gamma$  *отрицательно ориентирован относительно  $D$* .

ЗАМЕЧАНИЕ. Приведем подробный план доказательства предыдущей теоремы для случая произвольной замкнутой жордановой ломаной (для него у нас есть простое доказательство теоремы Жордана). Пусть  $\Sigma^+$  – замкнутая ориентированная жорданова ломаная с первым ребром  $[v_1, v_2]^+$ , и пусть  $a = (v_1 + v_2)/2$ . Обозначим через  $\Gamma^+$  – жорданову ломаную  $\Sigma^+ \setminus (v_1, v_2)$ . Если точка  $z^+ \rightarrow a$  (соответственно,  $z^- \rightarrow a$ ) по нормали к ребру  $[v_1, v_2]^+$  из неограниченной (соответственно, из ограниченной) компоненты дополнения к  $[\Sigma]$ , то  $\text{ind}_{\Gamma^+}(z^+) - \text{ind}_{\Gamma^+}(z^-) \rightarrow 0$  согласно предыдущему замечанию. Нетрудно установить также, что  $\text{ind}_{\Sigma^+}(z^+) = 0$ . Остается заметить, что

$$|\text{ind}_{[v_1, v_2]^+}(z^+) - \text{ind}_{[v_1, v_2]^+}(z^-)| \rightarrow 1.$$

### Эквивалентные пути. Действия с кривыми.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3. Пусть  $\gamma_{1,2} : [\alpha_{1,2}, \beta_{1,2}] \rightarrow \mathbb{C}$  – два пути. Они называются *эквивалентными* (обозначение:  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ ), если существует возрастающий гомеоморфизм  $h : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$  с условием  $\gamma_2(h(t)) = \gamma_1(t)$  при всех  $t \in [\alpha_1, \beta_1]$ .

УПРАЖНЕНИЕ 6.1. Доказать, что  $\simeq$  – отношение эквивалентности.

Класс эквивалентных путей (с представителем  $\gamma$ ) называется *кривой*, которая обозначается  $\Gamma$  (или  $\{\gamma\}$ ). Корректно определен *носитель*  $[\Gamma] = [\gamma]$  кривой  $\Gamma$ .

УПРАЖНЕНИЕ 6.2. Если  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ , то  $\text{ind}_{\gamma_1}(a) = \text{ind}_{\gamma_2}(a)$  для всех  $a \in \mathbb{C} \setminus [\gamma_1] = \mathbb{C} \setminus [\gamma_2]$ . Следовательно, корректно определен  $\text{ind}_\Gamma(a)$  – *индекс* кривой  $\Gamma$  относительно точки  $a \notin [\Gamma]$ .

Пусть  $\gamma_{1,2} : [\alpha_{1,2}, \beta_{1,2}] \rightarrow \mathbb{C}$  – два пути, причем  $\beta_1 = \alpha_2$  и  $\gamma_1(\beta_1) = \gamma_2(\alpha_2)$ . Тогда определен путь  $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 : [\alpha_1, \beta_2] \rightarrow \mathbb{C}$  по формуле

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [\alpha_1, \beta_1], \\ \gamma_2(t), & t \in [\alpha_2, \beta_2]. \end{cases}$$

Пусть  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  – кривые, причем конец  $\Gamma_1$  совпадает с началом  $\Gamma_2$ . Тогда можно определить кривую  $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ . Для этого нужно взять какие-либо представители  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  кривых  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  соответственно (т.е.  $\Gamma_1 = \{\gamma_1\}$  и  $\Gamma_2 = \{\gamma_2\}$ ), определенных (запараметризованных) на отрезках  $[0, 1]$  и  $[1, 2]$  соответственно, а затем рассмотреть кривую  $\Gamma = \{\gamma_1 \cup \gamma_2\}$ . Нетрудно доказать корректность этого

определения. Порядок путей и кривых в указанной операции *объединения путей и кривых*, очевидно, важен. Вопрос о коммутативности смысла не имеет.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4.** Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь. Тогда путь  $\gamma^-(t) = \gamma(\alpha + \beta - t) : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  называется *противоположным* к  $\gamma$ . Очевидным образом корректно определяется кривая  $\Gamma^-$ , противоположная кривой  $\Gamma$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 6.3.** Если  $a \notin [\Gamma_1] \cup [\Gamma_2]$  и определена кривая  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ , то  $\text{ind}_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2}(a) = \text{ind}_{\Gamma_1}(a) + \text{ind}_{\Gamma_2}(a)$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 6.4.** Если  $a \notin [\Gamma]$ , то  $\text{ind}_{\Gamma^-}(a) = -\text{ind}_{\Gamma}(a)$ .

### Спряжляемые пути и кривые.

Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь,  $T = \{\alpha = t_0, \dots, t_N = \beta\}$  – разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$  порядка  $N$  ( $N \in \mathbb{N}$ );  $\Delta t_n = t_n - t_{n-1} > 0$  ( $n \in \{1, \dots, N\}$ ). Число  $\lambda(T) = \max_{1 \leq n \leq N} \Delta t_n$  называется *диаметром разбиения*  $T$ .

Сопоставим каждому разбиению  $T$  величину  $l_T(\gamma) = \sum_{n=1}^N |\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})|$  – длину вписанной в  $\gamma$  ломаной, соответствующей  $T$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5.** *Длиной пути*  $\gamma$  называется (конечная или бесконечная) величина

$$l(\gamma) = \sup_T l_T(\gamma).$$

Если  $l(\gamma) < +\infty$ , то путь  $\gamma$  называется *спряжляемым*.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.5.** Доказать, что путь  $\gamma$  спряжляем, если и только если существует и конечен  $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} l_T(\gamma)$ , причем он равен  $l(\gamma)$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Легко видеть, что если  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ , то  $l(\gamma_1) = l(\gamma_2)$ ; в частности,  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  одновременно спряжляемые или нет. Поэтому корректно определены понятия *спряжляемой кривой* и ее *длины*  $l(\Gamma) := l(\gamma)$ , где  $\Gamma = \{\gamma\}$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 6.6.** Пусть  $K(t)$  – канторова лестница на  $[0, 1]$ . Определим путь  $\gamma(t) = t + iK(t)$  на  $[0, 1]$  («график»  $K$  на плоскости  $Oxy$ ,  $z = x + iy$ ). Доказать, что  $l(\gamma) = 2$ .

Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – спряжляемый путь, не постоянный ни на каком интервале  $(\alpha_1, \beta_1) \subset [\alpha, \beta]$ . Тогда функция  $s(t) = l(\gamma|_{[\alpha, t]})$  непрерывна и строго возрастает, и, следовательно, является гомеоморфизмом  $[\alpha, \beta]$  на  $[0, l(\gamma)]$ . Поэтому определены обратное отображение  $t = t(s)$  и путь  $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s)) : [0, l(\gamma)] \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\tilde{\gamma} \simeq \gamma$ . Параметр  $s$  называется *натуральным параметром* для кривой  $\Gamma = \{\gamma\}$ , а путь  $\tilde{\gamma}$  её *натуральной параметризацией*.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6.** Путь  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$  на  $[\alpha, \beta]$  называется *гладким*, если  $x(t)$  и  $y(t)$  являются функциями класса  $C^1([\alpha, \beta])$ , причем  $\dot{\gamma}(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t) \neq 0$  на  $[\alpha, \beta]$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.7.** Два гладких пути  $\gamma_{1,2} : [\alpha_{1,2}, \beta_{1,2}] \rightarrow \mathbb{C}$  называются *эквивалентными как гладкие пути*, если существует возрастающий диффеоморфизм (класса  $C^1$  в обе стороны)  $h : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$  такой, что  $\gamma_2(h(t)) = \gamma_1(t)$ ,  $t \in [\alpha_1, \beta_1]$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 6.7.** Эквивалентность гладких путей – отношение эквивалентности.

Класс эквивалентности гладких путей называется *гладкой кривой*.

УПРАЖНЕНИЕ 6.8. Если  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  – гладкие пути, эквивалентные как обычные пути, то они эквивалентны и как гладкие пути.

УПРАЖНЕНИЕ 6.9. Если  $\gamma$  – непрерывно дифференцируемый путь на  $[\alpha, \beta]$ , то он спрямляем и  $l(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} |\dot{\gamma}(t)| dt$ .

УПРАЖНЕНИЕ 6.10. Дать определения кусочно-гладкого пути, эквивалентности кусочно-гладких путей, кусочно-гладкой кривой.

### Интеграл вдоль пути и кривой по комплексной переменной.

Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь,  $f : [\gamma] \rightarrow \mathbb{C}$  – некоторая функция,  $T = \{\alpha = t_0, \dots, t_N = \beta\}$  – разбиение  $[\alpha, \beta]$ . Пусть  $\tau = \{\tau_1, \dots, \tau_N\}$  – выборка, подчиненная разбиению  $T$ , т.е.  $\tau_n \in [t_{n-1}, t_n]$  для каждого  $n \in \{1, \dots, N\}$ . Определим интегральную сумму:

$$\Sigma_{\gamma}(T, \tau, f) = \sum_{n=1}^N f(\gamma(\tau_n))(\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.8. Если существует конечный предел

$$I = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \Sigma_{\gamma}(T, \tau, f)$$

(т.е.  $\forall \varepsilon > 0$  найдется  $\delta > 0$  такое, что для всякого разбиения  $T$  с условием  $\lambda(T) < \delta$  и для всякой выборки  $\tau$ , подчиненной  $T$ , имеем  $|I - \Sigma_{\gamma}(T, \tau, f)| < \varepsilon$ ), то он называется *интегралом от функции  $f$  вдоль пути  $\gamma$*  и обозначается

$$\int_{\gamma} f(z) dz.$$

Функция  $f$  в этом случае называется *интегрируемой вдоль пути  $\gamma$  по комплексной переменной  $z$* .

УПРАЖНЕНИЕ 6.11. Пусть  $\gamma_1, \gamma_2$  – два произвольные пути. Если  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$  и функция  $f$  определена на  $[\gamma_1] = [\gamma_2]$ , то  $\int_{\gamma_1} f(z) dz$  и  $\int_{\gamma_2} f(z) dz$  существуют либо не существуют одновременно, и в первом случае они равны между собой. Следовательно, корректно определен *интеграл вдоль кривой  $\Gamma$  от функции  $f$* .

УПРАЖНЕНИЕ 6.12. Пусть для кривой  $\Gamma$  существуют интегралы  $\int_{\Gamma} f_1(z) dz$  и  $\int_{\Gamma} f_2(z) dz$ . Тогда  $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$  существует интеграл

$$\int_{\Gamma} (\lambda_1 f_1(z) + \lambda_2 f_2(z)) dz = \lambda_1 \int_{\Gamma} f_1(z) dz + \lambda_2 \int_{\Gamma} f_2(z) dz.$$

УПРАЖНЕНИЕ 6.13. Пусть для кривых  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  определена кривая  $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ , и  $f : [\Gamma] \rightarrow \mathbb{C}$ . Если существуют интегралы  $\int_{\Gamma_1} f(z) dz$  и  $\int_{\Gamma_2} f(z) dz$ , то существует интеграл

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2} f(z) dz.$$

Пусть  $E \subset \mathbb{C}$ ,  $E \neq \emptyset$ . Через  $C(E)$  обозначается пространство функций, непрерывных (по  $E$ ) в каждой точке  $a \in E$  и ограниченных на  $E$ . В  $C(E)$  определяется равномерная норма:

$$\|f\|_E = \sup_{z \in E} |f(z)|.$$

ТЕОРЕМА 6.3. Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – спрямляемый путь, функция  $f$  непрерывна на  $[\gamma]$ . Тогда  $\int_{\gamma} f(z) dz$  существует и выполняется неравенство

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \|f\|_{[\gamma]} \cdot l(\gamma). \quad (6.1)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Полагая  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  и  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ , по определению интегралов через соответствующие интегральные суммы получаем:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t)) d\gamma(t) = \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) dx(t) - \int_{\alpha}^{\beta} v(x(t), y(t)) dy(t) + \\ &+ i \cdot \left( \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) dy(t) + \int_{\alpha}^{\beta} v(x(t), y(t)) dx(t) \right), \end{aligned}$$

где  $\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t)) d\gamma(t)$  и другие интегралы в последней серии равенств являются интегралами Римана-Стилтьеса.

Докажем, например, существование интеграла  $\int_{\gamma} u dx = \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) dx(t)$ .

Функция  $u(x(t), y(t))$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$  как композиция непрерывных. Функция  $x(t)$  имеет на  $[\alpha, \beta]$  ограниченную вариацию, поскольку справедлива оценка  $\text{Var}_{[\alpha, \beta]}(x(t)) \leq l(\gamma)$  (проверить!). Из курса действительного анализа известно, что этих двух условий достаточно для существования интеграла Римана-Стилтьеса  $\int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) dx(t)$ .

Существование интегралов  $\int_{\gamma} v dy$ ,  $\int_{\gamma} u dy$ ,  $\int_{\gamma} v dx$  доказывается аналогично.

Наконец, для каждой интегральной суммы  $\Sigma_{\gamma}(T, \tau, f)$  справедлива оценка

$$|\Sigma_{\gamma}(T, \tau, f)| \leq \|f\|_{[\gamma]} \cdot l_T(\gamma) \leq \|f\|_{[\gamma]} \cdot l(\gamma).$$

Переходя к пределу при  $\lambda(T) \rightarrow 0$ , получаем требуемое неравенство (6.1).  $\square$



**7. Лекция 7. Интеграл вдоль непрерывно-дифференцируемого пути.  
Лемма Гурса. Лемма о приближении.**

**Интеграл вдоль непрерывно-дифференцируемого пути.**

**ТЕОРЕМА 7.1.** Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – непрерывно дифференцируемый путь, а функция  $f$  непрерывна на  $[\gamma]$ . Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt.$$

Мы несколько отложим доказательство этой теоремы. Сначала приведем один важный пример её использования, затем нам понадобится одно новое полезное понятие и некоторые предварительные результаты.

**ПРИМЕР 7.1.** Зафиксируем  $n \in \mathbb{Z}$ ; по определению положим  $z^0 = 1$  для всех  $z \in \mathbb{C}$ . Найдем значение  $\int_{\gamma_R} z^n dz$ , где  $\gamma_R(t) = Re^{it}|_{[0, 2\pi]}$  – окружность радиуса  $R$  с центром в нуле:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_R} z^n dz &= \int_0^{2\pi} (Re^{it})^n Rie^{it} dt = iR^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = \\ &= iR^{n+1} \int_0^{2\pi} \cos((n+1)t) dt - R^{n+1} \int_0^{2\pi} \sin((n+1)t) dt = \\ &= iR^{n+1} \int_0^{2\pi} \cos((n+1)t) dt = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

Этот простой результат именуется как "свойство ортогональности степеней" (пока без комментариев):

$$\int_{\gamma_R} z^n dz = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \quad (7.1)$$

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1.** Пусть  $E \subset \mathbb{C}$ ,  $E \neq \emptyset$ ,  $f : E \rightarrow \mathbb{C}$  – ограниченная функция. Модуль непрерывности функции  $f$  на множестве  $E$  определяется по формуле:

$$\omega_E(f, \delta) = \sup_{\substack{z_1, z_2 \in E \\ |z_1 - z_2| \leq \delta}} |f(z_1) - f(z_2)|.$$

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Очевидно, что функция  $f$  равномерно непрерывна на  $E \Leftrightarrow \omega_E(f, \delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$ .

**ЛЕММА 7.1.** Пусть  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$  – путь на  $[\alpha, \beta]$  класса  $C^1$ . Положим  $\mu(\delta) = \omega_{[\alpha, \beta]}(\dot{x}, \delta) + \omega_{[\alpha, \beta]}(\dot{y}, \delta)$ . Тогда  $\forall t \in [\alpha, \beta]$ ,  $\forall \Delta t > 0$  с условием  $[t, t + \Delta t] \subset [\alpha, \beta]$  и  $\forall \theta \in [t, t + \Delta t]$  выполняется оценка:

$$|\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t) - \dot{\gamma}(\theta)\Delta t| \leq \mu(\Delta t)\Delta t.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $t, \Delta t, \theta$  удовлетворяют условиям леммы. По теореме Лагранжа (для функций  $x(t)$  и  $y(t)$ ) при некоторых  $\theta_x, \theta_y \in [t, t + \Delta t]$  справедливы равенства:

$$\begin{aligned}x(t + \Delta t) - x(t) &= \dot{x}(\theta_x)\Delta t, \\y(t + \Delta t) - y(t) &= \dot{y}(\theta_y)\Delta t.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}|\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t) - \dot{\gamma}(\theta)\Delta t| &= |(x(t + \Delta t) - x(t) - \dot{x}(\theta)\Delta t) + \\&+ i \cdot (y(t + \Delta t) - y(t) - \dot{y}(\theta)\Delta t)| \leq (|\dot{x}(\theta_x) - \dot{x}(\theta)| + |\dot{y}(\theta_y) - \dot{y}(\theta)|)\Delta t \leq \\&\leq (\omega_{[\alpha, \beta]}(\dot{x}, \Delta t) + \omega_{[\alpha, \beta]}(\dot{y}, \Delta t))\Delta t = \mu(\Delta t)\Delta t,\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.  $\square$

Эта лемма является как бы заменой цитируемой в её доказательстве теоремы Лагранжа, которая не верна для путей на плоскости. Приведем пример:  $\gamma(t) = e^{it}|_{[0, 2\pi]}$ . Здесь  $\gamma(2\pi) - \gamma(0) = 0$ , однако  $\dot{\gamma}(t) = ie^{it} \neq 0$  при всех  $t \in [0, 2\pi]$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 7.1. Воспользуемся обозначениями последней леммы. В силу равномерной непрерывности функций  $\dot{x}$  и  $\dot{y}$  на  $[\alpha, \beta]$ , имеем:  $\mu(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$ .

Заметим, что интегралы, равенство которых требуется установить, существуют: левый – в силу спрямляемости  $C^1$ -пути и непрерывности  $f$  на его носителе (по теореме 6.3); правый – в силу непрерывности подынтегральной функции.

Пусть  $T = \{t_0, \dots, t_N\}$  – разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ ,  $\tau = \{\tau_1, \dots, \tau_N\}$  – выборка, подчиненная  $T$ . Оценим разность интегральных сумм для  $\int_{\gamma} f(z) dz$  и

$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t))\dot{\gamma}(t) dt$ , соответствующих паре  $(T, \tau)$ :

$$\begin{aligned}&\left| \sum_{n=1}^N f(\gamma(\tau_n))(\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})) - \sum_{n=1}^N f(\gamma(\tau_n))\dot{\gamma}(\tau_n)\Delta t_n \right| \leq \\&\leq \sum_{n=1}^N |f(\gamma(\tau_n))| \cdot |\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1}) - \dot{\gamma}(\tau_n)\Delta t_n| \leq \sum_{n=1}^N |f(\gamma(\tau_n))| \cdot \mu(\Delta t_n)\Delta t_n \leq \\&\leq \|f\|_{[\gamma]}(\beta - \alpha) \cdot \mu(\lambda(T)) \rightarrow 0\end{aligned}$$

при  $\lambda(T) \rightarrow 0$ . Далее ясно.  $\square$

### Лемма Гурса (теорема Коши для треугольников).

УПРАЖНЕНИЕ 7.1. Для произвольного отрезка  $[a, b]$  в  $\mathbb{C}$  доказать равенства:

$$\int_{[a, b]} z^n dz = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

Из этих равенств следует, что для всякого многочлена  $p(z)$  и всякого треугольника  $\Delta$  с положительно ориентированной границей  $\partial^+ \Delta$  справедливо равенство

$$\int_{\partial^+ \Delta} p(z) dz = 0.$$

Здесь и далее в этой лекции через  $\Delta$  обозначается замкнутый (вместе с внутренней областью) треугольник.

ЛЕММА 7.2. (Гурса). Пусть  $\Delta$  – треугольник с (положительно) ориентированной границей  $\partial^+ \Delta$ . Пусть функция  $f$  определена в некоторой окрестности  $\Delta$  и является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в каждой точке  $z \in \Delta$ . Тогда

$$\int_{\partial^+ \Delta} f(z) dz = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим противное:

$$\int_{\partial^+ \Delta} f(z) dz = I \neq 0.$$

Средними линиями разобьем треугольник  $\Delta = \Delta_0$  на 4 треугольника  $\Delta_1^{(1)}$ ,  $\Delta_2^{(1)}$ ,  $\Delta_3^{(1)}$ ,  $\Delta_4^{(1)}$  (как показано на рис. 7.1). Нетрудно видеть, что

$$\int_{\partial^+ \Delta_0} f(z) dz = \sum_{j=1}^4 \int_{\partial^+ \Delta_j^{(1)}} f(z) dz.$$

Следовательно, можно выбрать  $j_1 \in \{1, 2, 3, 4\}$  с условием  $\left| \int_{\partial^+ \Delta_1} f(z) dz \right| \geq \frac{|I|}{4}$ , где  $\Delta_1 = \Delta_{j_1}^{(1)}$ .

Аналогично, разбивая средними линиями треугольник  $\Delta_1$  на четыре треугольника  $\Delta_1^{(2)}$ ,  $\Delta_2^{(2)}$ ,  $\Delta_3^{(2)}$ ,  $\Delta_4^{(2)}$ , выберем  $j_2 \in \{1, 2, 3, 4\}$  с условием

$$\left| \int_{\partial^+ \Delta_2} f(z) dz \right| \geq \frac{|I|}{4^2},$$

где  $\Delta_2 = \Delta_{j_2}^{(2)}$ .

Продолжая построение по индукции, получаем систему вложенных замкнутых треугольников  $\Delta_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , со следующими свойствами (через  $P(\Delta_k)$  обозначается периметр треугольника  $\Delta_k$ ):

$$P(\Delta_k) = \frac{P(\Delta)}{2^k}, \quad \left| \int_{\partial^+ \Delta_k} f(z) dz \right| \geq \frac{|I|}{4^k}. \quad (7.2)$$

По теореме о вложенных компактах, существует точка  $z_0 = \bigcap_{k=0}^{\infty} \Delta_k \subset \Delta$ .

Поскольку функция  $f(z)$  по условию является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой всюду в  $\Delta$  (в частности, в точке  $z_0$ ), для нее справедливо представление:

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \mu(z)(z - z_0), \quad \mu(z) \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0.$$

Выражая отсюда  $\mu(z)$ , имеем:

$$\mu(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0), \quad z \neq z_0.$$

Функция  $\mu(z)$ , доопределенная нулем в точке  $z_0$ , определена и непрерывна на  $\Delta$ . Поэтому для произвольного  $\varepsilon > 0$  можно выбрать  $\delta = \delta(\varepsilon)$  так, что  $|\mu(z)| < \varepsilon$  при  $z \in B(z_0, \delta) \cap \Delta$ .




Рис. 7.1.

Определим  $n \in \mathbb{N}$  из условия:  $P_n = P(\Delta_n) < \delta$ . Ясно, что тогда  $\Delta_n \subset B(z_0, \delta) \cap \Delta$ . Теперь, пользуясь свойствами (7.2) и упражнением 7.1, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{|I|}{4^n} &\leq \left| \int_{\partial^+ \Delta_n} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial^+ \Delta_n} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \mu(z)(z - z_0)) dz \right| = \\ &= \left| \int_{\partial^+ \Delta_n} \mu(z)(z - z_0) dz \right| \leq \varepsilon P_n \cdot P_n = \varepsilon \frac{P(\Delta)^2}{4^n}, \end{aligned}$$

откуда  $|I| \leq \varepsilon P(\Delta)^2$ . При  $\varepsilon < \frac{|I|}{P(\Delta)^2}$  получаем противоречие. □

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2.** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ , функция  $f$  непрерывна в  $D$ . Говорят, что  $f$  удовлетворяет в  $D$  условию треугольника, если для всякого замкнутого треугольника  $\Delta \subset D$  выполняется равенство

$$\int_{\partial^+ \Delta} f(z) dz = 0.$$

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Если  $f$  голоморфна в  $D$ , то по лемме Гурса  $f$  удовлетворяет в  $D$  условию треугольника.

### Лемма о приближении.

**ЛЕММА 7.3. (О приближении).** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ , функция  $f$  непрерывна в  $D$ ,  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow D$  – спрямляемый путь. Тогда  $\forall \varepsilon > 0$  найдется  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  такое, что для всякого разбиения  $T$  отрезка  $[\alpha, \beta]$  с условием  $\lambda(T) < \delta$  выполнены следующие утверждения:

- (1)  $\|\gamma - \Lambda_\gamma^T\|_{[\alpha, \beta]} < \varepsilon$ ,  $[\Lambda_\gamma^T] \subset D$ ,
- (2)  $\left| \int_\gamma f(z) dz - \int_{\Lambda_\gamma^T} f(z) dz \right| < \varepsilon$ ,

где  $\Lambda_\gamma^T$  – ломаная, вписанная в  $\gamma$ , соответствующая разбиению  $T$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Будем считать, что путь  $\gamma$  нетривиален (неодноточечный), иначе всё просто. Положим  $d = \text{dist}([\gamma], \partial D)$  при  $\partial D \neq \emptyset$  ( $D \neq \mathbb{C}$ ),  $d = 1$  при  $D = \mathbb{C}$ . Определим множество  $K = \{z \in D \mid \text{dist}(z, [\gamma]) \leq \frac{d}{2}\}$  – компакт в  $D$ , содержащий  $[\gamma]$ .

Напомним определение модуля непрерывности функции  $g$  на множестве  $E$ :

$$\omega_E(g, r) = \sup_{\substack{z_1, z_2 \in E \\ |z_1 - z_2| \leq r}} |g(z_1) - g(z_2)|.$$

По условию, функция  $f$  непрерывна в  $D$ , а значит  $f$  равномерно непрерывна на  $K$ . Следовательно,

$$\mu(r) := \omega_K(f, r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0. \quad (7.3)$$

В силу равномерной непрерывности  $\gamma$  на  $[\alpha, \beta]$ , имеем:

$$\omega(r) := \omega_{[\alpha, \beta]}(\gamma, r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0. \quad (7.4)$$

Зафиксируем  $\varepsilon \in (0, \frac{d}{2})$ . Из (7.3) и (7.4), а также ввиду интегрируемости функции  $f$  вдоль  $\gamma$  ( $\gamma$  спрямляема и  $f$  непрерывна на  $[\gamma]$ ), найдется  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  такое, что

$$\omega(\delta) < \varepsilon, \quad \mu(\omega(\delta)) < \frac{\varepsilon}{2l(\gamma)}, \quad (7.5)$$

и для любого разбиения  $T$  отрезка  $[\alpha, \beta]$  с условием  $\lambda(T) < \delta$ , а также любой выборки  $\tau$ , подчиненной разбиению  $T$ , имеем:

$$\left| \Sigma_\gamma(T, \tau, f) - \int_\gamma f(z) dz \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (7.6)$$

Покажем, что указанное  $\delta$  удовлетворяет условиям доказываемой леммы.

Пусть теперь  $T = \{t_0, \dots, t_N\}$  – произвольное разбиение  $[\alpha, \beta]$  (порядка  $N$ ) с условием  $\lambda(T) < \delta$  и  $\Lambda_\gamma^T$  – соответствующая вписанная в  $\gamma$  ломаная. При  $n \in \{1, \dots, N\}$  положим  $\gamma_n = \gamma|_{[t_{n-1}, t_n]}$ . Тогда  $\forall t \in [t_{n-1}, t_n]$  справедлива оценка:

$$|\Lambda_\gamma^T(t) - \gamma_n(t)| \leq \max(|\gamma_n(t) - \gamma_n(t_{n-1})|, |\gamma_n(t) - \gamma_n(t_n)|) \leq \omega(\lambda(T)) < \varepsilon.$$

Следовательно,  $\|\Lambda_\gamma^T - \gamma\|_{[\alpha, \beta]} < \varepsilon$ , и (1) доказано. Заметим также, что  $[\Lambda_\gamma^T] \subset K$ , поскольку  $\forall t \in [\alpha, \beta]$  имеем  $\Lambda_\gamma^T(t) \in U_{d/2}(\gamma(t))$ .

Докажем теперь, что

$$\left| \int_{\Lambda_\gamma^T} f(z) dz - \Sigma_\gamma(T, \tau, f) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

для любой выборки  $\tau = \{\tau_1, \dots, \tau_N\}$ , подчиненной  $T$ . Тогда в силу (7.6) и неравенства треугольника будет доказано (2).

Пользуясь аддитивностью интеграла и определениями  $\Sigma_\gamma(T, \tau, f)$  и  $l(\gamma)$ , имеем:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Lambda_\gamma^T} f(z) dz - \Sigma_\gamma(T, \tau, f) \right| &\leq \sum_{n=1}^N \left| \int_{[\gamma(t_{n-1}), \gamma(t_n)]} f(z) dz - f(\gamma(\tau_n))(\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})) \right| = \\ &= \sum_{n=1}^N \left| \int_{[\gamma(t_{n-1}), \gamma(t_n)]} (f(z) - f(\gamma(\tau_n))) dz \right| \leq \\ &\leq \mu(\omega(\lambda(T))) \sum_{n=1}^N |\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})| \leq \mu(\omega(\delta)) \cdot l(\Lambda_\gamma^T) < \frac{\varepsilon}{2l(\gamma)} \cdot l(\gamma) = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.  $\square$

## 8. Лекция 8. Теорема Коши для односвязной области.

Существование первообразной в односвязной области. Формула Ньютона-Лейбница. Интегральная теорема Коши для допустимых областей.

### Теорема Коши для односвязной области.

ТЕОРЕМА 8.1. Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$  и пусть функция  $f$  удовлетворяет в  $D$  условию треугольника. Тогда для любой замкнутой спрямляемой кривой  $\Gamma \subset D$  выполняется равенство:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. По условию, утверждение теоремы верно, если  $\Gamma$  – ориентированная граница некоторого треугольника  $\Delta \subset D$  (из односвязности  $D$  и теоремы 2.2 следует, что и внутренность треугольника  $\Delta$  лежит в  $D$ ).

2. Если  $\Gamma$  – граница выпуклого многоугольника  $G \subset D$ , то этот многоугольник можно разбить его диагоналями на треугольники, и свести нужное утверждение к случаю треугольника.

3. Теперь проверим нужное утверждение для произвольной (ориентированной) замкнутой жордановой ломаной  $\Gamma$  в  $D$ . Поскольку область  $D$  односвязна, жорданов (открытый) многоугольник  $G$ , ограниченный ломаной  $[\Gamma]$ , целиком лежит в  $D$  (см. теорему 2.2 и доказательство теоремы Жордана для многоугольников в разделе "Спецкурс"). Поэтому, по аналогии со случаем 2., достаточно установить следующее утверждение и затем воспользоваться методом индукции.

ЛЕММА 8.1. В указанных обозначениях, существует диагональ многоугольника  $G$  (открытый интервал, соединяющий несоседние вершины в  $\Gamma$ ), целиком лежащая в  $G$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По индукции. Пусть лемма доказана для всех жордановых ломаных с числом вершин меньшим, чем  $N$ . Пусть  $A_1, \dots, A_N$  – последовательные вершины ломаной  $\Gamma$  ( $N \geq 4$ ), причем никакие соседние ребра этой ломаной не являются продолжениями друг друга (т.е. все внутренние углы многоугольника  $G$  отличны от  $\pi$  рад.), иначе мы можем считать, что число вершин ломаной на самом деле равно  $N - 1$ , и всё доказано. Делая при необходимости параллельный перенос и перенумерацию вершин, мы можем предположить, что  $A_2 = 0$  – это вершина ломаной  $\Gamma$  с минимальной ординатой (т.е.  $\text{Im}(z) \geq 0$  для всех  $z \in [\Gamma]$ ). Следовательно, внутренний угол  $\angle A_1 A_2 A_3$  многоугольника  $G$  (с вершиной  $A_2$ ) имеет величину, меньшую  $\pi$ . Если интервал  $(A_1, A_3)$  целиком лежит в  $G$ , то всё доказано. Пусть это не так.

В этом случае на  $(A_1, A_3)$  или внутри треугольника  $\Delta A_1 A_2 A_3$  должна находиться хотя бы одна точка множества  $[\Gamma]' = [\Gamma] \setminus ([A_1, A_2] \cup [A_2, A_3])$ . Из соображений непрерывности найдутся точки  $a_1$  и  $a_3$  на полуинтервалах  $(A_2, A_1]$  и  $(A_2, A_3]$  соответственно такие, что интервалы  $(a_1, a_3)$  и  $(A_1, A_3)$  параллельны, внутри треугольника  $\Delta a_1 A_2 a_3$  нет точек из  $[\Gamma]'$  (откуда внутренность  $\Delta a_1 A_2 a_3$  лежит в  $G$ ), а на  $(a_1, a_3)$  есть точки из  $[\Gamma]'$  (хотя бы одна точка  $a$ ). Если  $a$  – одна из вершин  $A_n$ ,  $n > 3$ , то  $(A_2, A_n)$  – искомая диагональ. Если точка  $a$  не является вершиной ломаной  $\Gamma$ , то она лежит внутри некоторого ребра  $[A_n, A_{n+1}]$ , которое должно содержаться в интервале  $(a_1, a_3)$ , откуда снова  $A_n \in (a_1, a_3)$  и  $(A_2, A_n)$  – искомая диагональ.

□

4. Пусть, наконец,  $\Gamma$  – произвольная замкнутая нежорданова ломаная в  $D$ . У неё есть представитель – замкнутый кусочно-линейный путь  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ , для которого найдется натуральное  $N > 1$  и разбиение  $T = \{\alpha = t_0, \dots, t_N = \beta\}$  отрезка  $[\alpha, \beta]$  порядка  $N$  такое, что при каждом  $n \in \{1, \dots, N\}$  имеем  $\gamma(t) = c_n t + d_n$  на  $[t_{n-1}, t_n]$  ( $c_n$  и  $d_n$  – комплексные постоянные).

ЛЕММА 8.2. *Справедливо хотя бы одно из следующих утверждений:*

(1) для любой функции  $f \in C([\Gamma])$  выполняется равенство  $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$  (случай, когда  $\Gamma$  не имеет замкнутых жордановых "частей");

(2) существуют замкнутые жордановы ломаные  $\Gamma_1, \dots, \Gamma_J$  ( $J \geq 1$ ) такие, что  $[\Gamma_j] \subset [\Gamma]$  для всех  $j \in \{1, \dots, J\}$  и для любой функции  $f \in C([\Gamma])$  имеем

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^J \int_{\Gamma_j} f(z) dz.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство этой леммы легко свести к случаю, когда все указанные выше коэффициенты  $c_n \neq 0$ , и  $N$  – минимально возможное в таком представлении ломаной  $\Gamma$ . Тогда будем говорить, что  $\Gamma$  имеет порядок  $N$ .

Применим индукцию по  $N$ . Пусть лемма доказана для всех указанных ломаных порядка не выше  $N - 1$ , и  $\Gamma$  – ломаная порядка  $N$  с представителем  $\gamma$  (и введенными выше обозначениями). Можем считать  $N \geq 3$ . Пусть  $A_n = \gamma(t_n)$  ( $n \in \{1, \dots, N\}$ ) – последовательные вершины ломаной  $\Gamma$ . Если какие-нибудь соседние ребра этой ломаной лежат на одной прямой, то шаг индукции сделать совсем легко. Далее полагаем, что таких соседних ребер нет. Пусть  $E$  – совокупность тех  $t' \in (\alpha, \beta)$ , для которых путь  $\gamma|_{[\alpha, t']}$  является жордановым (незамкнутым). Тогда  $E = (\alpha, \beta_1)$  – открытый интервал,  $\beta_1 \in (\alpha, \beta)$ . При этом найдется единственная точка  $\alpha_1 \in [\alpha, \beta_1]$  условием  $\gamma(\alpha_1) = \gamma(\beta_1)$ . Ломаная  $\Gamma_1$  с представителем  $\gamma|_{[\alpha_1, \beta_1]}$  – замкнутая жорданова. При этом замкнутая ломаная  $\Gamma' = \{\gamma|_{[\alpha, \alpha_1]}\} \cup \{\gamma|_{[\beta_1, \beta]}\}$  имеет порядок меньший, чем  $N$ ,  $[\Gamma_1] \subset [\Gamma]$ ,  $[\Gamma'] \subset [\Gamma]$ , и  $\forall f \in C([\Gamma])$  выполнено

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma'} f(z) dz.$$

Далее ясно. □

Таким образом, для произвольной замкнутой ломаной утверждение теоремы 8.1 также справедливо.

5. В общем случае остается воспользоваться леммой 7.3 о приближении. □

СЛЕДСТВИЕ 8.1. Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$  и пусть функция  $f$  удовлетворяет в  $D$  условию треугольника. Тогда для любых спрямляемых кривых  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  в  $D$  с одинаковыми началами и концами выполняется равенство:

$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \int_{\Gamma_2} f(z) dz.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 8.1,

$$0 = \int_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2^-} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2^-} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz - \int_{\Gamma_2} f(z) dz.$$

□

**Существование первообразной в односвязной области. Формула Ньютона-Лейбница (Н-Л).**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1.** Пусть  $D$  – произвольная область в  $\mathbb{C}$ ,  $F \in \mathcal{A}(D)$  и  $F'(z) = f(z)$  в  $D$ . Тогда  $F$  называется *комплексной первообразной* (п/о) для функции  $f$  в  $D$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 8.1.** Если  $F_1$  и  $F_2$  – две п/о для функции  $f$  в  $D$ , то  $F_1 - F_2 \equiv \text{const}$  в  $D$ .

**ТЕОРЕМА 8.2.** (О существовании п/о в односвязной области). Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$ , и пусть  $f$  удовлетворяет в  $D$  условию треугольника. Для любого фиксированного  $a \in D$  определим функцию

$$F_a(z) = \int_{\Gamma_{az}} f(\zeta) d\zeta,$$

где  $\Gamma_{az}$  – любая спрямляемая кривая в  $D$  с началом в точке  $a$  и концом в точке  $z$  (по следствию 8.1 значения  $F_a(z)$  не зависят от выбора кривой  $\Gamma_{az}$ ).

Тогда функция  $F_a(z)$  является п/о для функции  $f$  в  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Фиксируем произвольное  $z_0 \in D$  и  $\delta_0 > 0$  с условием  $B(z_0, \delta_0) \subset D$ . Докажем, что  $F'_a(z_0) = f(z_0)$ . Пусть  $\varepsilon > 0$  произвольно. В силу непрерывности  $f$  в  $D$  найдется  $\delta = \delta(\varepsilon) \leq \delta_0$  такое, что  $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$  при  $|z - z_0| < \delta$ . Для  $z \in B(z_0, \delta)$  проведем оценку:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F_a(z) - F_a(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| &= \left| \frac{1}{z - z_0} \left( \int_{\Gamma_{az}} f(\zeta) d\zeta - \int_{\Gamma_{az_0}} f(\zeta) d\zeta \right) - f(z_0) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} f(z_0) d\zeta \right| = \left| \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta \right| \leq \\ &\leq \|f - f(z_0)\|_{[z_0, z]} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Из этой оценки следует, что

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_a(z) - F_a(z_0)}{z - z_0} = f(z_0),$$

т.е.  $F'_a(z_0) = f(z_0)$ . □

**ТЕОРЕМА 8.3.** (Формула Н-Л). Пусть  $D$  – произвольная область в  $\mathbb{C}$ , функция  $f$  непрерывна в  $D$  и для нее существует п/о  $F$  в  $D$ . Тогда для любой спрямляемой кривой  $\Gamma_{ab}$  в  $D$  с началом  $a$  и концом  $b$  справедлива формула (Ньютона-Лейбница):

$$\int_{\Gamma_{ab}} f(z) dz = F(b) - F(a). \quad (8.1)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Из леммы 7.3 о приближении следует, что достаточно установить равенство (8.1) для ломаных в  $D$ . Кроме того, очевидно, что равенство (8.1) для ломаной следует из аналогичного равенства для каждого из её последовательных отрезков. Т.е. остается установить (8.1) для случая, когда  $\Gamma_{ab} = [a, b]$  – отрезок в  $D$  с параметризацией  $\gamma_{ab}(t) = \gamma(t) = a + t \cdot (b - a)$ ,  $t \in [0, 1]$ . По теореме 7.1 получаем:

$$\int_{[a, b]} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt = \int_0^1 (F(\gamma(t)))'_t dt = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0)) = F(b) - F(a).$$



В этой серии равенств применена теорема о производной сложной функции (см. лемму 4.1) и формула Н-Л на отрезке (проверить!).  $\square$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.2.** Пусть  $D$  – произвольная область в  $\mathbb{C}$  и функция  $f$  непрерывна в  $D$ . Тогда  $f$  имеет п/о в  $D$  если и только если для любой замкнутой спрямляемой кривой  $\Gamma$  в  $D$  справедливо равенство

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

**ПРИМЕР 8.1.** Функция  $f(z) = \frac{1}{z}$  не имеет п/о в  $\mathbb{C}_b$ , поскольку

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = 2\pi i \neq 0, \quad \gamma_1(t) = e^{it}|_{[0, 2\pi]}.$$

### Интегральная теорема Коши (ИТК) для допустимых областей.

Пусть замкнутый жорданов путь  $\gamma_c$  (с началом в точке  $c$ ), ограничивающий жорданову область  $G$ , является положительно ориентированным относительно  $G$ . Если  $\gamma$  – произвольный путь с такими же условиями, то пути  $\gamma$  и  $\gamma_c$  эквивалентны. Пусть  $\partial_c^+ G = \{\gamma_c\}$  – кривая, определяемая путем  $\gamma_c$ .

Если теперь  $b$  – произвольная точка на  $\partial G$  и  $\gamma_b \in \partial_b^+ G$ , то для любой (ограниченной) функции  $f$  на  $\partial D$  имеем  $\int_{\gamma_b} f(z) dz = \int_{\gamma_c} f(z) dz$  (интегралы существуют или нет одновременно).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2.** Положительно ориентированной границей  $\partial^+ G$  жордановой области  $G$  в  $\mathbb{C}$  называется совокупность всех кривых  $\{\partial_c^+ G : c \in \partial G\}$ . Таким образом, корректно определен  $\int_{\partial^+ G} f(z) dz$ .

Смысл обозначения  $\partial^- G$  очевиден без дополнительного пояснения.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3.** Пусть  $D_1, \dots, D_S$  – жордановы области в  $\mathbb{C}$  ( $S \in \mathbb{N}$ ) со спрямляемыми положительно ориентированными границами  $\partial^+ D_1, \dots, \partial^+ D_S$  соответственно. При  $S = 1$  положим  $D = D_1$ , а при  $S \geq 2$  предположим, что замыкания областей  $D_2, \dots, D_S$  попарно не пересекаются и целиком содержатся внутри  $D_1$ . При  $S \geq 2$  кроме того потребуем, чтобы множество  $D = D_1 \setminus \left(\bigcup_{s=2}^S \overline{D}_s\right)$  было связно, т.е. являлось областью (то, что это верно всегда, мы докажем позже, как следствие из теоремы Римана о конформном отображении).

Такие множества  $D$  будем называть допустимыми областями (ДО) ранга  $S$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4.** Положительно ориентированной границей допустимой области  $D$  ранга  $S \geq 2$  называется совокупность (цепь) границ:

$$\partial^+ D = \{\partial^+ D_1, \partial^- D_2, \dots, \partial^- D_S\}.$$

Для  $f : \partial D \rightarrow \mathbb{C}$  интеграл от  $f$  по  $\partial^+ D$  определяется по формуле:

$$\int_{\partial^+ D} f(z) dz = \int_{\partial^+ D_1} f(z) dz - \sum_{s=2}^S \int_{\partial^+ D_s} f(z) dz,$$

если указанные справа интегралы существуют.

Справедлива следующая интегральная теорема Коши.

ТЕОРЕМА 8.4. (ИТК для ДО). Пусть  $D$  – допустимая область в  $\mathbb{C}$  и  $f \in C(\overline{D})$  удовлетворяет в  $D$  условию  $\Delta$ . Тогда

$$\int_{\partial^+ D} f(z) dz = 0. \quad (8.2)$$

Мы докажем ослабленный вариант этой теоремы для случая т.н. *простых областей*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.5. Жорданова область  $G$  называется *простейшей*, если её положительно ориентированная граница задается следующей параметризацией:

$$\gamma(t) = a + r(t)e^{it}, \quad t \in [\alpha, \alpha + 2\pi]$$

(т.е.  $\{\gamma\} \in \partial^+ G$ ). Здесь  $a \in \mathbb{C}$ ,  $\alpha \in [-\pi, \pi)$  и  $r : [\alpha, \alpha + 2\pi] \rightarrow (0, +\infty)$  – непрерывная функция с ограниченной вариацией и условием  $r(\alpha) = r(\alpha + 2\pi)$ .

Важно, что в указанном случае понятие  $\partial^+ G$  определяется напрямую (без использования теоремы Жордана в общем виде). Кроме того, обычно берется  $\alpha = -\pi$  или  $\alpha = 0$ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8.1. В условиях предыдущего определения:

- (1) для  $\gamma$  выполняется теорема Жордана;
- (2) путь  $\gamma$  спрямляем;

$$(3) \quad \text{ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ G} \frac{dz}{z - z_0} = 1, \quad \forall z_0 \in G;$$

$$(4) \quad \text{ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ G} \frac{dz}{z - z_0} = 0, \quad \forall z_0 \in \mathbb{C} \setminus \overline{G};$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Свойства (1) и (2) достаточно просты (проверить!). Свойства индекса в (3) и (4) уже обсуждены (пользуемся его локальной постоянностью и целочисленностью, и вычисляем указанный индекс по определению в точке  $a$ ). Как мы независимо покажем чуть ниже (в более общем контексте), для функции  $h(z) = \int_{\partial^+ G} (z - z_0)^{-1} dz$  имеем:  $h'(z_0) = \int_{\partial^+ G} (z - z_0)^{-2} dz = 0$  вне  $[\gamma]$ . Последнее равенство нулю вытекает из формулы Ньютона-Лейбница (при переменной  $z$ ) для функции  $(z - z_0)^{-2}$  с п/о  $-(z - z_0)^{-1}$ . Остается доказать, что  $(2\pi i)^{-1} \int_{\partial^+ G} (z - a)^{-1} dz = 1$ . Последнее доказывается с применением формулы Н-Л в области  $\mathbb{C}$  с разрезом  $\{a + t \mid t \in (-\infty, 0]\}$  для функции  $(z - a)^{-1}$  с п/о  $\ln(z - a)$ , пути  $\gamma_\varepsilon = \gamma|_{[-\pi+\varepsilon, \pi-\varepsilon]}$  (случай  $\alpha = -\pi$ ),  $\varepsilon \in (0, \pi/2)$ :

$$\int_{\gamma_\varepsilon} \frac{dz}{z - z_0} = \ln(r(\pi - \varepsilon)e^{i(\pi - \varepsilon)}) - \ln(r(-\pi + \varepsilon)e^{i(-\pi + \varepsilon)}) = \ln \frac{r(\pi - \varepsilon)}{r(-\pi + \varepsilon)} + i(2\pi - 2\varepsilon)$$

и последующим устремлением  $\varepsilon$  к нулю. □


**9. Лекция 9. Доказательство ИТК для простых областей.  
Интегральная формула Коши. Теорема о среднем и принцип  
максимума модуля. Формула Коши для производных. Теорема  
Морера.**

**Доказательство ИТК для простых областей.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9.1. *Утверждение ИТК верно для простейших областей.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть в условиях теоремы 8.4 и определения 8.5  $D = G$  – простейшая область. При  $n \in \mathbb{N}$  пусть  $G_n$  – область, гомотетичная области  $G$  относительно точки  $a$  с коэффициентом  $(n+1)/n$ , и пусть

$$f_n(z) = f\left(a + \frac{n(z-a)}{n+1}\right).$$



Очевидно, что  $G_n$  односвязна и  $f_n$  удовлетворяет в  $G_n$  условию треугольника (по определению, сравнить соответствующие интегральные суммы). Так как  $G \subset G_n$ , по теореме Коши для односвязной области  $G_n$ , функции  $f_n$  и замкнутой кривой  $\partial^+ G$  имеем:

$$\int_{\partial^+ G} f_n(z) dz = 0.$$

Теперь, поскольку

$$\left| \int_{\partial^+ G} f_n(z) dz - \int_{\partial^+ G} f(z) dz \right| \leq \|f_n - f\|_{\partial^+ G} l(\partial^+ G),$$

остается установить, что  $f_n \rightarrow f$  на  $\partial^+ G$  при  $n \rightarrow +\infty$ . В самом деле, при любом  $z \in \partial^+ G$  имеем:

$$\left| z - \left(a + \frac{n(z-a)}{n+1}\right) \right| = \frac{|z-a|}{n+1} \leq \frac{\text{diam}(G)}{n+1},$$

откуда

$$|f(z) - f_n(z)| = \left| f(z) - f\left(a + \frac{n(z-a)}{n+1}\right) \right| \leq \omega_{\bar{G}}\left(f, \frac{\text{diam}(G)}{n+1}\right) \rightarrow 0$$

при  $n \rightarrow +\infty$ . □

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1. Область  $D$  в  $\mathbb{C}$  называется *простой*, если

- (1) она является допустимой и все  $D_s$  из определения 8.3 для  $D$  являются простейшими областями;
- (2) существует конечное число простейших областей  $G'_1, \dots, G'_N$  со следующими свойствами:

- (а) все  $G'_n \subset D$  и различные  $G'_n$  попарно не пересекаются;  
 (б) для всякой функции  $f \in C(\overline{D})$  имеем:

$$\int_{\partial^+ D} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \int_{\partial^+ G'_n} f(z) dz.$$

УПРАЖНЕНИЕ 9.1. Всякое открытое (концентрическое) кольцо  $V(a, r, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}$  ( $0 < r < R < +\infty$ ) является простой областью.

СЛЕДСТВИЕ 9.1. ИТК справедлива для любой простой области.

УПРАЖНЕНИЕ 9.2. В условиях определения 9.1 всегда  $\overline{D} = \bigcup_{n=1}^N \overline{G}'_n$ . Кроме того,  $D$  всегда связно (без дополнительного требования в определении 8.3).

УПРАЖНЕНИЕ 9.3. Найти простейшую области  $G$  с "центром"  $a = 0$  такую, что при всех достаточно малых  $r > 0$  область  $G \setminus \overline{B}(a, r)$  не является простой.

### Интегральная формула Коши (ИФК).


ТЕОРЕМА 9.1. (ИФК). Пусть  $D$  – допустимая область,  $f \in \mathcal{A}(D) \cap C(\overline{D})$ . Тогда для любого  $z_0 \in D$  справедлива формула:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f(z) dz}{z - z_0}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (Для простых областей). Фиксируем  $z_0 \in D$  и пусть

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}, & z \in \overline{D} \setminus \{z_0\}, \\ f'(z_0), & z = z_0. \end{cases}$$

Тогда  $g \in C(\overline{D})$  и  $g$  удовлетворяет в  $D$  условию треугольника (при  $z_0 \in \Delta$  рассматриваемый треугольник  $\Delta$  разбивается на два треугольника, к каждому из которых применяется предложение 9.1).



По ИТК в  $D$  имеем:

$$\int_{\partial^+ D} g(z) dz = 0,$$

откуда

$$\int_{\partial^+ D} \frac{f(z) dz}{z - z_0} = f(z_0) \int_{\partial^+ D} \frac{dz}{z - z_0}.$$

Остается доказать, что

$$h(z_0) = \int_{\partial^+ D} \frac{dz}{z - z_0} \equiv 2\pi i, \quad z_0 \in D.$$

Пусть  $D$  – простая область с обозначениями определения 9.1. Поскольку функция  $h(z)$  непрерывна в  $D$ , достаточно (пользуясь определением 9.1 и упражнением 9.2) установить последнее равенство для  $z_0 \in G'_n$  при любом фиксированном  $n$ , а это вытекает из предложения 8.1 (свойств (3) и (4)).  $\square$

Нам потребуются определение и свойства интеграла (1 рода)  $\int_{\gamma} f(z)|dz|$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2.** Пусть  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  – путь,  $f : [\gamma] \rightarrow \mathbb{C}$  – некоторая функция,  $T = \{\alpha = t_0, \dots, t_N = \beta\}$  – разбиение  $[\alpha, \beta]$ . Пусть  $\tau = \{\tau_1, \dots, \tau_N\}$  – выборка, подчиненная разбиению  $T$ , т.е.  $\tau_n \in [t_{n-1}, t_n]$  для каждого  $n \in \{1, \dots, N\}$ . Определим интегральную сумму:

$$\Sigma_{\gamma}^+(T, \tau, f) = \sum_{n=1}^N f(\gamma(\tau_n)) |\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})|.$$

Если существует конечный предел

$$I^+ = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \Sigma_{\gamma}^+(T, \tau, f)$$

(т.е.  $\forall \varepsilon > 0$  найдется  $\delta > 0$  такое, что для всякого разбиения  $T$  с условием  $\lambda(T) < \delta$  и для всякой выборки  $\tau$ , подчиненной  $T$ , имеем  $|I^+ - \Sigma_{\gamma}^+(T, \tau, f)| < \varepsilon$ ), то он называется *интегралом 1 рода от функции  $f$  по (длине пути)  $\gamma$*  и обозначается

$$\int_{\gamma} f(z) |dz|.$$

Следующие свойства этого интеграла доказываются почти также, как аналогичные (доказанные выше) свойства интеграла  $\int_{\gamma} f(z) dz$ .

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9.2.** В условиях предыдущего определения:

(1) если путь  $\gamma$  спрямляем и  $f \in C([\gamma])$ , то  $\int_{\gamma} f(z)|dz|$  существует и

$$\left| \int_{\gamma} f(z)|dz| \right| \leq \|f\|_{[\gamma]} l(\gamma);$$

(2) если путь  $\gamma$  – непрерывно дифференцируемый и  $f \in C([\gamma])$ , то

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| dt.$$

Важно еще отметить, что в указанных обозначениях всегда  $\int_{\gamma^-} f(z)|dz| = \int_{\gamma} f(z)|dz|$  (оба интеграла существуют или нет одновременно) и, следовательно, корректно определен  $\int_{\partial D} f(z)|dz|$  для любой допустимой области  $D$ .

**ТЕОРЕМА 9.2.** (О среднем). Пусть  $R \in (0, +\infty)$  и  $f \in \mathcal{A}(B(z_0, R)) \cap C(\overline{B(z_0, R)})$ . Тогда

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(z_0 + Re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B(z_0, R)} f(z) |dz|. \quad (9.1)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** По ИФК:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(z_0, R)} \frac{f(z) dz}{z - z_0}.$$

Остается вычислить последний интеграл (и последний интеграл в формуле 9.1) с помощью стандартной параметризации  $\{z = z_0 + Re^{it} \mid t \in [-\pi, \pi]\}$ .  $\square$

**ТЕОРЕМА 9.3. (Основная теорема алгебры).** Пусть  $n \in \mathbb{N}$  и  $p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$  – произвольный многочлен степени  $n$  комплексного переменного  $z$  ( $a_n \neq 0$ ). Тогда  $p$  имеет в  $\mathbb{C}$  хотя бы один корень.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть, от противного,  $p(z) \neq 0$  при всех  $z$ . Тогда  $f(z) = \frac{1}{p(z)}$  – целая функция. Поскольку  $|p(z)| \rightarrow +\infty$  при  $z \rightarrow \infty$ , мы получаем, что  $|f(z)| \rightarrow 0$  при  $z \rightarrow \infty$ . Применяя теорему о среднем для  $f$  в кругах  $B(0, R)$  и стандартную оценку интеграла, получаем, что

$$|f(0)| = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B(0, R)} f(z) |dz| \right| \leq \lim_{R \rightarrow +\infty} \|f\|_{\partial B(0, R)} = 0.$$

Противоречие.  $\square$

**ТЕОРЕМА 9.4. (Принцип максимума модуля).** Пусть  $D$  – произвольная ограниченная область в  $\mathbb{C}$ . Если  $f \in \mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D})$ , то для любого  $z_0 \in D$  имеем

$$|f(z_0)| \leq \max_{z \in \partial D} |f(z)| = \|f\|_{\partial D}. \quad (9.2)$$

При этом, если для некоторого  $z_0 \in D$  неравенство (9.2) обращается в равенство, то  $f$  постоянна в  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Напомним, что максимум всякой непрерывной на компакте функции достигается. Нам достаточно доказать, что если найдется  $z_0 \in D$  с условием  $|f(z_0)| \geq \|f\|_{\partial D}$ , то  $f$  – постоянна. Пусть такое  $z_0$  существует. Без ограничения общности мы можем предположить, что  $M = |f(z_0)| = \|f\|_{\bar{D}}$ . Положим  $E = \{z \in D \mid |f(z)| = M\}$ . Ясно, что  $E \neq \emptyset$  и  $E$  замкнуто в  $D$  (последнее вытекает из непрерывности  $f$ ). Открытость  $E$  следует из теоремы о среднем (провести доказательство!). Из связности  $D$  получаем, что  $E = D$ . Итак,  $|f(z)| \equiv M$  на  $\bar{D}$ . Остается доказать, что  $f'(z) = 0$  всюду в  $D$ . Если, от противного, существует  $z_1 \in D$  с условием  $f'(z_1) \neq 0$ , то из определения  $\mathbb{C}$ -дифференцируемости получаем, что  $f(z) = f(z_1) + f'(z_1)(z - z_1) + o(z - z_1)$ ,  $z - z_1 \rightarrow 0$ , так что  $|f(z)|$  не может быть постоянным ни в какой окрестности точки  $z_1$ . Противоречие.  $\square$

### ИФК для производных. Интеграл типа Коши. Теорема Морера.

**ТЕОРЕМА 9.5. (ИФК для производных).** Пусть  $D$  – допустимая область в  $\mathbb{C}$ ,  $f \in \mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D})$ . Тогда при каждом  $k \in \mathbb{N}$  функция  $f^{(k)} \in \mathcal{A}(D)$ , причем для любого  $z_0 \in D$  справедлива формула:

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{k+1}}.$$

Эта теорема сразу вытекает из ИФК и следующего утверждения, имеющего и другие важные следствия (например, в частном случае  $k = 1$  и  $f(z) \equiv 1$  оно уже использовалось в доказательстве предложения 8.1).

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9.3.** Пусть  $\Gamma$  – спрямляемая кривая в  $\mathbb{C}$ ,  $f \in C([\Gamma])$ . При фиксированном  $k \in \mathbb{N}$  определим функцию

$$F_k(z) = \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^k}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus [\Gamma].$$

Тогда  $F_k$  голоморфна вне  $[\Gamma]$  и верна формула:  $F_k'(z) = kF_{k+1}(z)$ ,  $z \in \mathbb{C} \setminus [\Gamma]$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Функция  $F_k(z)$  в этом предложении называется *интегралом типа Коши* порядка  $k$  от функции  $f$  по кривой  $\Gamma$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Фиксируем  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus [\Gamma]$  и положим  $d = d(z_0, [\Gamma])$ . Пусть всюду далее  $\Delta z \in B(0, d/2)$ ,  $\Delta z \neq 0$ . Имеем:

$$\frac{F_k(z_0 + \Delta z) - F_k(z_0)}{\Delta z} = \int_{\Gamma} f(z) g_{\Delta z}(z) dz,$$

где

$$g_{\Delta z}(z) = \frac{1}{\Delta z} \left( \frac{1}{(z - z_0 - \Delta z)^k} - \frac{1}{(z - z_0)^k} \right).$$

Докажем, что  $g_{\Delta z} \Rightarrow k(z - z_0)^{-k-1}$  на  $[\Gamma]$  при  $\Delta z \rightarrow 0$ . Для этого сначала напомним, что (по элементарной формуле  $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + b^{k-1})$ )

$$g_{\Delta z}(z) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{(z - z_0)^j (z - z_0 - \Delta z)^{k+1-j}},$$

причем при  $z \in [\Gamma]$  и  $|\Delta z| < d/2$  имеем:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{(z - z_0)^j (z - z_0 - \Delta z)^{k+1-j}} - \frac{1}{(z - z_0)^{k+1}} \right| &\leq \frac{1}{d^j} \left| \frac{1}{(z - z_0 - \Delta z)^{k+1-j}} - \frac{1}{(z - z_0)^{k+1-j}} \right| \\ &\leq \frac{|\Delta z|}{d^j} \left| \sum_{l=1}^{k+1-j} \frac{1}{(z - z_0)^l (z - z_0 - \Delta z)^{k+2-j-l}} \right| \leq \frac{2^{k+1-j} (k+1-j) |\Delta z|}{d^{k+2}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

при  $\Delta z \rightarrow 0$ . Остается воспользоваться оценкой (6.1) для функции  $f(z)g_{\Delta z}(z) - kf(z)/(z - z_0)^{k+1}$  вместо  $f(z)$ .  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 9.2. Если  $f$  имеет в  $D$  (комплексную)  $n$ -ю, то  $f \in \mathcal{A}(D)$ .

ТЕОРЕМА 9.6. (Морера). Пусть  $D$  – произвольная область в  $\mathbb{C}$  и  $f$  удовлетворяет в  $D$  условию  $\Delta$ . Тогда  $f \in \mathcal{A}(D)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно воспользоваться теоремой 8.2 о первообразной в односвязной области (для кругов из  $D$ ) и следствием 9.2.  $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 9.4. Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$ , функция  $f$  голоморфна в  $D$  (в частности,  $f$  удовлетворяет условию треугольника в  $D$ ), и пусть  $f$  не обращается в ноль всюду в  $D$ . Тогда существует голоморфная ветвь  $g(z)$  многозначной функции  $\text{Ln } f(z)$  в  $D$  (т.е. существует  $g \in \mathcal{A}(D)$  с условиями  $g(z) \in \text{Ln } f(z)$  для всех  $z \in D$ , или же  $f(z) = \exp(g(z))$ ).

СЛЕДСТВИЕ 9.0.1. Пусть  $n \in \{2, 3, \dots\}$ . В условиях предыдущего упражнения функция  $h_n(z) = \exp(g(z)/n)$  является голоморфной ветвью многозначной функции  $\sqrt[n]{f(z)}$  в  $D$  (т.е.  $h_n \in \mathcal{A}(D)$ , причем  $h_n(z) \in \sqrt[n]{f(z)}$  для всех  $z \in D$ , т.е.  $f(z) = (h_n(z))^n$ ).

**10. Лекция 10. Теорема Вейерштрасса. Степенные ряды. Теорема Коши-Тейлора и её следствия.**

**Теорема Вейерштрасса.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1.** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ . Последовательность  $\{f_n\} = \{f_n\}_{n=1}^{+\infty}$  функций  $f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$  сходится *равномерно внутри*  $D$  к функции  $f$  при  $n \rightarrow +\infty$  (коротко:  $f_n \rightrightarrows f$  вн.  $D$  при  $n \rightarrow +\infty$ ), если эта последовательность сходится к  $f$  равномерно на всяком компакте  $K$  из  $D$  (т.е.  $\|f - f_n\|_K \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow +\infty$ ).

**ПРИМЕР 10.1.** Последовательность функций  $z^n \rightrightarrows 0$  *внутри*  $B_1$ , но не сходится равномерно на  $B_1$  при  $n \rightarrow +\infty$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2.** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ . Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$  функций  $f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$  сходится *равномерно внутри*  $D$  к своей сумме  $S$ , если последовательность  $\{S_n\}_{n=1}^{+\infty}$  частичных сумм этого ряда сходится к  $S$  равномерно внутри  $D$  при  $n \rightarrow +\infty$ .

**ТЕОРЕМА 10.1. (Вейерштрасса).** Пусть последовательность  $\{f_n\}_{n=1}^{+\infty}$  функций из  $\mathcal{A}(D)$  равномерно внутри  $D$  сходится к функции  $f$  при  $n \rightarrow +\infty$ . Тогда  $f \in \mathcal{A}(D)$  и для каждого  $k \in \mathbb{N}$  последовательность  $\{f_n^{(k)}\}_{n=1}^{+\infty}$  сходится к  $f^{(k)}$  равномерно внутри  $D$  при  $n \rightarrow +\infty$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Свойство  $f \in \mathcal{A}(D)$  следует из леммы Гурса, свойства сохранения условия  $\Delta$  при равномерной сходимости внутри  $D$  и теоремы 9.6 (Морера). Из соображений индукции и компактности нам достаточно установить, что  $\|f'_n - f'\|_K \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow +\infty$ , где  $K$  – произвольный замкнутый круг в  $D$ . Пусть  $K = \overline{B}(a, r)$  и  $d > 0$  таково, что  $\overline{B}(a, r + d) \subset D$ . Положим  $\Gamma^+ = \partial^+ B(a, r + d)$  ( $\Gamma = \partial B(a, r + d)$  – компакт в  $D$ ) и воспользуемся теоремой 9.5 для  $f_n$  и  $f$  в области  $B(a, r + d)$  при  $k = 1$ . Если  $z_0 \in K$ , то

$$|f'_n(z_0) - f'(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\Gamma^+} \frac{f_n(z) - f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \|f_n - f\|_{\Gamma} \cdot d^{-2} \cdot 2\pi(r + d) \rightarrow 0$$

при  $n \rightarrow +\infty$ , поскольку  $f_n \rightrightarrows f$  на  $\Gamma$ . □

**Степенные ряды. Лемма Абеля. Формула Коши-Адамара.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.3.** *Степенным рядом* называется функциональный ряд

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \dots \quad (10.1)$$

Постоянные  $c_n \in \mathbb{C}$  называются *коэффициентами*, а точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  – *центром* степенного ряда (10.1). Для всякого  $N \in \mathbb{N}$  полином

$$S_N(z) = \sum_{n=0}^N c_n (z - z_0)^n$$

называется *частичной суммой порядка  $N$*  ряда (10.1).

Множество точек сходимости ряда (10.1) обозначим через  $E$ ;  $z_0 \in E \neq \emptyset$ .

**ЛЕММА 10.1. (Абеля).** Если ряд (10.1) сходится в точке  $z_1 \neq z_0$ , то он сходится равномерно внутри круга  $B(z_0, |z_1 - z_0|)$ .



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно доказать, что имеет место равномерная сходимость на любом замкнутом круге  $\overline{B}(z_0, r)$ , где  $r < |z_1 - z_0|$ .

Положим  $q = r/|z_1 - z_0|$ . Поскольку  $q < 1$ , ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$  сходится. Напомним, что необходимым условием сходимости (числового) ряда

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z_1 - z_0)^n$$

является условие  $c_n(z_1 - z_0)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , из которого для всех  $n$  следует оценка  $|c_n(z_1 - z_0)^n| < M$  при некотором  $M > 0$ .

Покажем, что сходящийся числовой ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} Mq^n$  является равномерной мажорантой для ряда (10.1) при  $z \in \overline{B}(z_0, r)$ :

$$|c_n(z - z_0)^n| = |c_n(z_1 - z_0)^n| \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^n \leq Mq^n.$$

Следовательно, по признаку Вейерштрасса, ряд (10.1) сходится равномерно на  $B(z_0, r)$ , что и требовалось.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 10.1.1. Если ряд (10.1) расходится в некоторой точке  $z_2 \neq z_0$ , то он расходится всюду вне замкнутого круга  $\overline{B}(z_0, |z_2 - z_0|)$ .

СЛЕДСТВИЕ 10.1.2. Для любого ряда вида (10.1) определено число  $R \in [0, +\infty]$  и (при  $R > 0$ ) круг  $B = B(z_0, R)$  со следующим свойством: ряд (10.1) сходится равномерно внутри  $B$  и расходится вне  $\overline{B}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.4. Число  $R$  называется радиусом сходимости, а круг  $B = B(z_0, R) = E^\circ$  – областью (кругом) сходимости ряда (10.1).

СЛЕДСТВИЕ 10.1.3. Пусть  $S(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n$  – сумма ряда (10.1) и  $R > 0$ . Тогда функция  $S(z)$  голоморфна в круге сходимости  $B(z_0, R)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пользуясь леммой Абеля, применяем теорему Вейерштрасса к последовательности  $\{S_N\}$  частичных сумм ряда (10.1).  $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 10.1. Доказать формулу Коши Адамара для радиуса сходимости ряда (10.1):

$$R = \frac{1}{l}, \text{ где } l = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|} \in [0, +\infty].$$

По ряду (10.1) определим еще один степенной ряд:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n n (z - z_0)^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{n+1} (n+1) (z - z_0)^n.$$

Он называется почленно продифференцированным рядом для ряда (10.1).

Обозначим его радиус сходимости через  $R'$ .

ТЕОРЕМА 10.2. Пусть  $R > 0$  – радиус сходимости ряда (10.1),  $S(z)$  – его сумма. Тогда  $R' = R$  и  $\forall z \in B = B(z_0, R)$  выполнено равенство

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{n+1} (n+1) (z - z_0)^n. \quad (10.2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (10.2) для  $z \in B$  следует из теоремы Вейерштрасса, примененной к последовательности  $\{S_N\}$  частичных сумм. Отсюда же следует оценка  $R' \geq R$ . Равенство  $R = R'$  можно получить из формулы Коши-Адамара.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 10.1. Ряд (10.1) можно почленно дифференцировать сколько угодно раз.

Рассмотрим теперь почленно проинтегрированный ряд для ряда (10.1):

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-z_0)^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_{n-1}}{n} (z-z_0)^n. \quad (10.3)$$

Обозначим через  $R_f$  его радиус сходимости. Следующее утверждение легко вытекает из теоремы 10.2 и доказанной ранее теоремы Ньютона-Лейбница.

СЛЕДСТВИЕ 10.2. Пусть  $R > 0$  – радиус сходимости ряда (10.1). Тогда  $R_f = R$  и  $\forall z \in B = B(z_0, R)$  выполняется равенство

$$\int_{\Gamma_{z_0 z}} S(\zeta) d\zeta = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_{n-1}}{n} (z-z_0)^n,$$

где последний интеграл (первообразная функции  $S(z)$ ) берется по любой спрямляемой кривой  $\Gamma_{z_0 z}$  в  $B$  с началом  $z_0$  и концом  $z$ .

### Теорема Коши-Тейлора (ТКТ) и ее следствия.

ТЕОРЕМА 10.3. (ТКТ, о разложении в ряд Тейлора). Пусть  $r \in (0, +\infty]$ ,  $B = B(z_0, r)$ , и пусть  $f \in \mathcal{A}(B)$ . Тогда  $\forall z \in B$  выполняется равенство  $f(z) = T_{z_0}^f(z)$ , где

$$T_{z_0}^f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n \quad (10.4)$$

– ряд Тейлора функции  $f$  с центром в точке  $z_0$ . В частности, для радиуса сходимости  $R_T$  ряда Тейлора  $T_{z_0}^f$  справедлива оценка  $R_T \geq r$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Установим равенство (10.4) в произвольной точке  $z \in B$ . Положим  $\delta = |z - z_0| < r$  и зафиксируем  $\rho \in (\delta, r)$ .

Воспользуемся интегральной формулой Коши в круге  $B_\rho = B(z_0, \rho)$ :

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_\rho} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}.$$

Заметим, что  $\forall \zeta \in \partial B_\rho$  верно  $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| = q$ , где  $q = \frac{\delta}{\rho} < 1$ , поэтому

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}.$$

Последний ряд сходится абсолютно и равномерно на множестве  $\{\zeta \in \partial B_\rho\}$ , поскольку он мажорируется числовым рядом  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{\rho} \cdot \left(\frac{\delta}{\rho}\right)^k$ .

Нам понадобится следующее простое утверждение.

УПРАЖНЕНИЕ 10.2. Пусть  $\Gamma$  – спрямляемая кривая,  $\{F_n\}_{n=0}^{+\infty}$  – последовательность функций, непрерывных на  $[\Gamma]$ , с условием  $F_n \rightrightarrows F$  на  $[\Gamma]$ , и пусть  $g \in C([\Gamma])$ . Тогда

$$\int_{\Gamma} g(\zeta) F_n(\zeta) d\zeta \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma} g(\zeta) F(\zeta) d\zeta. \quad (10.5)$$

Воспользуемся этим утверждением при  $\Gamma = \partial^+ B_\rho$ ,  $F_n(\zeta) = \sum_{k=0}^n \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}$  и  $g(\zeta) = f(\zeta)$ :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_\rho} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_\rho} f(\zeta) \sum_{k=0}^n \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \stackrel{(10.5)}{=} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (z - z_0)^k \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_\rho} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{k+1}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k, \end{aligned}$$

где в последнем равенстве мы воспользовались ИФК для производных.

Теорема 10.3 доказана.  $\square$

**СЛЕДСТВИЕ 10.3.** (Единственность разложения в степенной ряд). Пусть  $r > 0$ ,  $B = B(z_0, r)$  и для всех  $z \in B$  справедливо равенство  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ . Тогда

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Заметим, что указанный здесь ряд автоматически имеет радиус сходимости не менее  $r$ . Остается воспользоваться теоремой 10.2 о почленном дифференцировании степенного ряда.  $\square$

**СЛЕДСТВИЕ 10.4.** (Неравенства Коши для коэффициентов Тейлора). В условиях теоремы 10.3, при  $\rho \in (0, r)$  положим  $M_\rho = \max_{\zeta \in \partial B_\rho} |f(\zeta)|$ . Тогда для коэффициентов

Тейлора  $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$  справедлива оценка:

$$|c_n| \leq \frac{M_\rho}{\rho^n}. \quad (10.6)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Нужная оценка следует из ИФК для производных:

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_\rho} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M_\rho}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M_\rho}{\rho^n}.$$

$\square$

**СЛЕДСТВИЕ 10.5.** (Теорема Лиувилля). Пусть  $f \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$  – целая функция, и пусть найдется  $p \in [0, +\infty)$  с условием  $f(z) = O(|z|^p)$  при  $|z| \rightarrow +\infty$ . Тогда  $f$  является многочленом степени не выше  $[p]$ .

В частности, если целая функция  $f$  ограничена, то  $f \equiv \text{const}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Поскольку  $f \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$ , по теореме 10.3 всюду в  $\mathbb{C}$  функция  $f$  представляется своим рядом Тейлора с центром в нуле, т.е.  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$ . Положим  $M_\rho = \max_{|\zeta|=\rho} |f(\zeta)|$ . По условию, найдется константа  $C > 0$  такая, что  $M_\rho \leq C(\rho^p + 1)$ .

По предыдущему следствию имеем оценку:  $|c_n| \leq \frac{C(\rho^p + 1)}{\rho^n}$ , справедливую для всех  $\rho > 0$ . Если в этой оценке фиксировать любое  $n > p$  и устремить  $\rho$  к бесконечности, то получим  $c_n = 0$ , что и требовалось доказать.  $\square$

**Табличные разложения в ряд Тейлора ( $z_0 = 0$ ). .**

Из теоремы 10.3, формулы Коши-Адамара и следствия 10.2 (для доказательства (7)) вытекают следующие (табличные) разложения в ряд Тейлора:

$$(1) \quad e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < +\infty;$$

$$(2) \quad \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} (-1)^m \frac{z^{2m+1}}{(2m+1)!}, \quad |z| < +\infty;$$

$$(3) \quad \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} (-1)^m \frac{z^{2m}}{(2m)!}, \quad |z| < +\infty;$$

$$(4) \quad \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \quad |z| < 1;$$

$$(5) \quad \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n}, \quad |z| < 1;$$

$$(6) \quad (1+z)_{(o)}^p = 1 + pz + \dots + \frac{p(p-1)\dots(p-n+1)}{n!} z^n + \dots, \quad |z| < 1, \quad p \notin \{0, 1, 2, \dots\};$$

$$(7) \quad \operatorname{arctg} z = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} (-1)^m \frac{z^{2m+1}}{2m+1}, \quad |z| < 1.$$

**11. Лекция 11. Теорема о нулях и теорема единственности для ГФ. Пространства Бергмана  $\mathcal{A}^p(D)$  и пространство  $\mathcal{A}(D)$ . Обобщенные степенные ряды. Теорема Лорана. Связь рядов Лорана и Фурье.**

**Теорема о нулях и теорема единственности для ГФ.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.1. Пусть даны точка  $a \in \mathbb{C}$  и функция  $f \in \mathcal{A}(a)$ . Если  $f(a) = 0$ , то точка  $a$  называется *нулем голоморфной функции*  $f$ .

Если  $\exists p \in \mathbb{N}$  с условием  $0 = f(a) = \dots = f^{(p-1)}(a) \neq f^{(p)}(a)$ , то говорят, что  $a$  – *нуль порядка  $p$  для функции*  $f$ .

При  $p = 1$  точка  $a$  называется *простым нулем функции*  $f$ .

Если  $f(a) \neq 0$ , то (для общности) точка  $a$  называется *нулем функции  $f$  порядка 0*.

Если не оговорено противного, порядок нуля далее считается натуральным.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.2. Пусть  $a \in \mathbb{C}$  – нуль функции  $f$ . Говорят, что он *изолированный*, если  $\exists \delta > 0$  такое, что  $f(z) \neq 0$  в  $B'(a, \delta) = B(a, \delta) \setminus \{a\}$ .

ТЕОРЕМА 11.1. (О нулях ГФ). Пусть  $a$  – нуль голоморфной функции  $f$ . Следующие условия эквивалентны:

- (1)  $a$  – *изолированный нуль функции*  $f$ ;
- (2)  $a$  *имеет некоторый конечный порядок*  $p \in \mathbb{N}$ ;
- (3)  $\exists g \in \mathcal{A}(a)$  с условиями  $g(a) \neq 0$  и в некоторой окрестности точки  $a$  имеет место равенство  $f(z) = (z - a)^p g(z)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По условию,  $f \in \mathcal{A}(a)$ , т.е. существуют  $\delta > 0$  и круг  $B = B(a, \delta)$  такой, что  $f \in \mathcal{A}(B)$ .

Докажем (1)  $\Rightarrow$  (2) от противного. Если  $a$  – нуль бесконечного порядка, то  $f^{(n)}(a) = 0$  при всех  $n \in \mathbb{Z}_+$ . Поэтому  $T_a^f \equiv 0$ . Но  $f(z) = T_a^f(z)$  в  $B$ , следовательно,  $f \equiv 0$  в  $B$  и точка  $a$  не является изолированным нулем. Противоречие.

Установим (2)  $\Rightarrow$  (3). Пусть  $p \in \mathbb{N}$  – порядок нуля  $a$  для ГФ  $f$ . Тогда  $f(a) = \dots = f^{(p-1)}(a) = 0$ , но  $f^{(p)}(a) \neq 0$ . Следовательно, для коэффициентов  $\{c_n\}_{n=0}^{+\infty}$  ряда  $T_a^f$  верно  $c_0 = \dots = c_{p-1} = 0$ , но  $c_p \neq 0$ . В круге  $B$  справедливо равенство

$$\begin{aligned} f(z) = T_a^f(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n = c_p (z - a)^p + c_{p+1} (z - a)^{p+1} + \dots = \\ &= (z - a)^p (c_p + c_{p+1} (z - a) + \dots) = (z - a)^p g(z), \end{aligned}$$

где функция  $g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{p+n} (z - a)^n$  голоморфна в круге  $B$  и  $g(a) = c_p \neq 0$ .

Осталось доказать (3)  $\Rightarrow$  (1). Поскольку  $g \in \mathcal{A}(B)$  и  $g(a) \neq 0$ , функция  $g(z) \neq 0$  в некотором (возможно, меньшем, чем  $B$ ) круге  $B_1 = B(a, \delta_1)$ ,  $\delta_1 > 0$ . Функция  $(z - a)^p$  не обращается в ноль в проколотой окрестности точки  $a$ . Следовательно,  $f(z) = (z - a)^p g(z) \neq 0$  в  $B'_1$ , т.е.  $a$  – изолированный нуль функции  $f$ .  $\square$

ТЕОРЕМА 11.2. (Единственности). Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$  и функция  $f \in \mathcal{A}(D)$ . Пусть  $Z_f = \{z \in D \mid f(z) = 0\}$  – множество нулей  $f$  в  $D$ . Если  $Z_f$  имеет в  $D$  хотя бы одну предельную точку, то  $Z_f = D$ , т.е.  $f \equiv 0$  в  $D$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $a \in D$  – предельная точка  $Z_f$ . В силу непрерывности функции  $f$ ,  $a \in Z_f$ . Следовательно,  $a$  – неизолированный нуль ГФ  $f$ . Обозначим через  $\tilde{Z}_f$  множество всех неизолированных нулей функции  $f$  в  $D$ ,  $\tilde{Z}_f \subseteq Z_f \subseteq D$ . Мы установили, что  $\tilde{Z}_f \neq \emptyset$ . Докажем, что  $\tilde{Z}_f$  одновременно открыто и замкнуто в  $D$ . Тогда в силу связности  $D$  будем иметь  $\tilde{Z}_f = D$ , откуда следует утверждение теоремы.

Пусть  $z_0 \in \tilde{Z}_f$ . Тогда по теореме 11.1 точка  $z_0$  – нуль бесконечного порядка для  $f$ . Следовательно,  $f(z) = T_{z_0}^f(z) \equiv 0$  в некоторой окрестности  $U(z_0) \subseteq D$  точки  $z_0$ .

Ясно, что  $U(z_0) \subseteq \tilde{Z}_f$ , т.е. любая точка входит в  $\tilde{Z}_f$  вместе с некоторой окрестностью. Замкнутость множества  $\tilde{Z}_f$  в  $D$  следует из непрерывности  $f$ .  $\square$

**ПРИМЕР 11.1.** Отметим, что прямого аналога теоремы 11.2 для функций действительного переменного нет даже в классе  $C^\infty(\mathbb{R})$ . В качестве примера можно взять функцию

$$f(x) = e^{-1/x^2} \sin(1/x), \quad x \neq 0,$$

$f(0) = 0$ . Здесь точка  $x = 0$  – не изолированный нуль для  $f$ .

**Теорема об особой точке на границе круга сходимости степенного ряда.** Рассмотрим степенной ряд с центром в точке  $z_0$ :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n. \quad (11.1)$$

Пусть радиус сходимости этого ряда равен  $R \in (0, +\infty)$ ,  $B = B(z_0, R)$  – соответствующий круг сходимости, и  $S \in \mathcal{A}(B)$  – его сумма.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.3.** Назовем точку  $a \in \partial B$  *неособой для  $S$* , если  $\exists \delta_a > 0$  и функция  $f_a \in \mathcal{A}(B(a, \delta_a))$  такая, что  $f_a(z) = S(z)$  для всех  $z \in B \cap B(a, \delta_a)$ .

В противном случае точка  $a \in \partial B$  называется *особой для  $S$* .

**ТЕОРЕМА 11.3.** *В описанных выше условиях на  $\partial B$  существует хотя бы одна особая точка для  $S$ .*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Предположим противное – все точки  $\partial B$  неособые. Покроем каждую точку  $a$  компакта  $\partial B$  кругом  $B_a = B(a, \delta_a)$  из определения неособой точки и выберем конечное подпокрытие:  $\partial B \subset \bigcup_{n=1}^N B_{a_n}$ .

Пусть  $B_{a_n} \cap B_{a_m} \neq \emptyset$ . Тогда из определения  $B_a$  и  $f_a$  следует, что  $f_{a_n} \equiv f_{a_m} \equiv S$  на множестве  $B_{a_n} \cap B_{a_m} \cap B$ . Но тогда из теоремы 11.2 следует, что  $f_{a_n} \equiv f_{a_m}$  всюду на  $B_{a_n} \cap B_{a_m}$ .

Это рассуждение показывает, что функцию  $S$  можно продолжить до голоморфной в области  $D = B \cup \left( \bigcup_{n=1}^N B_{a_n} \right)$  функции  $\tilde{S}$ . По построению, найдется  $\varepsilon > 0$  такое, что

$B(z_0, R + \varepsilon) \subset D$ . Но тогда, разлагая функцию  $\tilde{S}$  в ряд Тейлора с центром  $z_0$  и пользуясь его единственностью, мы получаем, что радиус сходимости ряда (11.1) не меньше, чем  $R + \varepsilon$ . Противоречие.  $\square$

### Пространства Бергмана $\mathcal{A}^p(D)$ и пространство $\mathcal{A}(D)$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.4.** Для произвольной области  $D$  в  $\mathbb{C}$  и  $p \in [1, +\infty]$  определим следующие  $p$ -пространства Бергмана голоморфных функций в  $D$ :

(1) при  $p = +\infty$  полагаем  $\mathcal{A}^\infty(D) = \mathcal{A}(D) \cap L^\infty(D)$  с нормой

$$\|f\|_{\infty, D} = \sup_{z \in D} |f(z)|;$$

эти пространства являются банаховыми по теореме Вейерштрасса;

(2) при  $p \in [1, +\infty)$  определим  $\mathcal{A}^p(D) = \mathcal{A}(D) \cap L^p(D)$  с нормой

$$\|f\|_{p, D} = \left( \int \int_D |f(z)|^p dx dy \right)^{1/p};$$

эти пространства являются банаховыми по теореме Вейерштрасса с дополнительным применением теоремы о среднем по кругам и неравенства Гельдера (проверить); пространства  $\mathcal{A}^2(D)$  являются гильбертовыми с эрмитовым произведением

$$(f, g)_D = \int \int_D f(z) \overline{g(z)} dx dy.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.5. Для произвольной области  $D$  в  $\mathbb{C}$ ,  $D \neq \mathbb{C}$ , при  $n \in \mathbb{N}$  пусть

$$K_n = \{z \in D \mid |z| \leq n, d(z, \partial D) \geq 1/n\}$$

и  $n_1$  – первый номер  $n$ , для которого  $K_n \neq \emptyset$ . Тогда  $\{K_n\}_{n=n_1}^{+\infty}$  называется *стандартным исчерпанием* области  $D$  (указанной возрастающей последовательностью компактов). При  $D = \mathbb{C}$  полагаем  $K_n = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq n\}$ .

В пространстве  $\mathcal{A}(D)$  введем следующую (бинарную) величину:

$$\rho_{\mathcal{A}}(f, g) = \sum_{n=n_1}^{+\infty} 2^{-n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}.$$

УПРАЖНЕНИЕ 11.1. (а) пользуясь возрастанием функции  $\varphi(t) = t/(1+t)$  на  $[0, +\infty)$  и её свойством  $\varphi(t_1 + t_2) \leq \varphi(t_1) + \varphi(t_2)$  при  $t_1 \geq 0$  и  $t_2 \geq 0$ , доказать, что  $\rho_{\mathcal{A}}(f, g)$  является метрикой;

(б) установить, что сходимость последовательностей в этой метрике эквивалентна равномерной сходимости внутри  $D$ , откуда сразу вытекает *полнота* метрики  $\rho_{\mathcal{A}}(f, g)$ ;

(в)\* доказать, что эта метрика ненормируема (теорема П.С. Урысона).

### Обобщенные степенные ряды. Теорема Лорана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.6. *Обобщенным степенным рядом* называется (формальный) ряд вида

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n. \quad (11.2)$$

(\*)           (a)           (b)

Как и в случае степенных рядов, точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется *центром*, а постоянные  $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  – *коэффициентами* обобщенного степенного ряда (11.2).

Говорят, что ряд (11.2) *сходится в точке*  $z_1 \in \mathbb{C}$ , если в этой точке одновременно сходятся ряды (a) и (b).

Для ряда (b) пусть  $R_2 \in [0, +\infty]$  – его радиус сходимости, т.е. ряд (b) сходится абсолютно и равномерно внутри  $B_2 = B(z_0, R_2)$  и расходится в  $\mathbb{C} \setminus \overline{B_2}$ .

Сопоставив с помощью замены  $w = 1/(z - z_0)$  ряду (a) степенной ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} w^n$ , легко показать, что существует  $R_1 \in [0, +\infty]$  такое, что ряд (a) расходится в  $B_1 = B(z_0, R_1)$  и сходится абсолютно и равномерно внутри  $\mathbb{C} \setminus \overline{B_1}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 11.2. По формуле Коши-Адамара найти  $R_1$  и  $R_2$  через  $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.7. При  $R_1 < R_2$  множество  $V_* = \{z \in \mathbb{C} \mid R_1 < |z - z_0| < R_2\}$  называется *кольцом сходимости ряда* (11.2). По доказанному, ряд (11.2) сходится *абсолютно и равномерно внутри*  $V_*$ .

(При  $R_1 \geq R_2$  имеем  $V_* = \emptyset$ .)

ТЕОРЕМА 11.4. (Лорана). Пусть  $V = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - z_0| < R\}$  – кольцо с центром  $z_0 \in \mathbb{C}$  ( $0 \leq r < R \leq +\infty$ ) и функция  $f \in \mathcal{A}(V)$ .

Тогда всюду в  $V$  функция  $f$  разлагается в обобщенный степенной ряд

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (11.3)$$

с коэффициентами  $c_n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , однозначно определяющимися по формулам:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(z_0, \rho)} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}, \quad (11.4)$$

где  $\rho \in (r, R)$  – произвольно фиксированное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Зафиксируем произвольную точку  $z \in V$  и выберем  $r_0$  и  $R_0$  с условиями  $r < r_0 < |z - z_0| < R_0 < R$ . Обозначим  $\Gamma_0^+ = \partial^+ B(z_0, R_0)$  и  $\gamma_0^+ = \partial^+ B(z_0, r_0)$ . В кольце  $V_0 = \{ \zeta \in \mathbb{C} \mid r_0 < |\zeta - z_0| < R_0 \}$  воспользуемся интегральной формулой Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_0^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_0^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = F_0(z) + f_0(z),$$

где

$$F_0(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_0^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}, \quad f_0(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_0^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}.$$

Представление для  $F_0$  получается как в доказательстве теоремы Коши-Тейлора:

$$F_0(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_0^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}. \quad (11.5)$$

Рассмотрим подробнее  $f_0(z)$ . В силу выбора  $r_0$ , для точек  $\zeta \in [\gamma_0]$  выполнено неравенство  $|\zeta - z_0| < |z - z_0|$ , поэтому

$$-\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (\zeta - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\zeta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}},$$

причем последний ряд сходится абсолютно и равномерно (по  $\zeta$ ) на  $[\gamma_0]$ . Сделав замену  $m = -n - 1$ , можно записать предыдущую цепочку равенств в виде

$$-\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{m=-\infty}^{-1} \frac{(z - z_0)^m}{(\zeta - z_0)^{m+1}}.$$

Повторяя обоснование смены порядка суммирования и интегрирования в доказательстве теоремы Коши-Тейлора, получаем равенство:

$$f_0(z) = \sum_{m=-\infty}^{-1} c_m (z - z_0)^m, \quad c_m = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_0^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{m+1}}, \quad m \in \{-1, -2, \dots\}. \quad (11.6)$$

Теперь важно отметить, что при каждом фиксированном  $n$  интегралы в (11.4) для всех  $\rho \in (r, R)$  совпадают: достаточно при любых  $\rho_1 < \rho_2$  из  $(r, R)$  применить интегральную теорему Коши для кольца  $\{\rho_1 < |\zeta - z_0| < \rho_2\}$  и функции  $f(\zeta)/(\zeta - z_0)^{n+1}$ .

Объединяя (11.5) и (11.6), получаем представление для  $f(z)$ , имеющее вид (11.3) с коэффициентами (11.4). При этом ряд (11.3) сходится равномерно внутри  $V$ .

Докажем единственность. Пусть для  $f$  в  $V$  справедливо какое-то представление вида (11.3). Тогда ряд  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - z_0)^n$  сходится равномерно внутри  $V$ . Поэтому при фиксированных  $p \in \mathbb{Z}$  и  $\rho \in (r, R)$  получаем

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(z_0, \rho)} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{p+1}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(z_0, \rho)} \left( \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (\zeta - z_0)^{n-p-1} \right) d\zeta = c_p$$

по свойству ортогональности степеней. Теорема доказана.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 11.1. (Неравенства Коши для коэффициентов Лорана). В условиях и обозначениях теоремы Лорана, при  $\rho \in (r, R)$  определим  $M_\rho = \|f\|_{\partial B(z_0, \rho)}$ . Тогда справедливы оценки

$$|c_n| \leq \frac{M_\rho}{\rho^n}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (11.7)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Аналогично доказательству неравенств Коши для коэффициентов Тейлора.  $\square$



### Связь рядов Лорана с рядами Фурье.

Пусть  $V = \{r < |z| < R\}$  – кольцо при  $0 \leq r < 1 < R \leq +\infty$ . В частности, окружность  $\Gamma_1 = \{|z| = 1\} \subset V$ . При  $f \in \mathcal{A}(V)$  функция  $g(t) = f(e^{it})$  является  $2\pi$ -периодической бесконечно-дифференцируемой функцией на  $\mathbb{R}$ . Тогда, если  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$  – разложение функции  $f$  в ряд Лорана в  $V$ , то  $g(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{int}$  – разложение функции  $g$  в ряд Фурье на отрезке  $[-\pi, \pi]$  (в комплексной форме).

УПРАЖНЕНИЕ 11.3. Разложить функцию  $g(t) = 1/(2 - \cos(t))$  в ряд Фурье на  $[-\pi, \pi]$ .

*Указание.* Пусть  $z = e^{it}$ , тогда  $\cos(t) = (z + 1/z)/2$  и в качестве  $f$  следует взять функцию  $f(z) = (2 - (z + 1/z)/2)^{-1} = -2z/(z^2 - 4z + 1)$ , голоморфную в кольце  $\{2 - \sqrt{3} < |z| < 2 + \sqrt{3}\}$ .

Ответ:  $g(t) = 1/\sqrt{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} (2/\sqrt{3})(2 - \sqrt{3})^n \cos(nt)$ .

**12. Лекция 12. Классификация изолированных особых точек (ИОТ) ГФ.**  
**Теорема Сохоцкого. Лемма Шварца и её следствие. ИОТ  $\infty$ . Вычеты в ИОТ.**

**Классификация изолированных особых точек (ИОТ) ГФ.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.1. Пусть  $a \in \mathbb{C}$ ,  $\delta > 0$  и функция  $f \in \mathcal{A}(B'(a, \delta))$ , но  $f \notin \mathcal{A}(a)$  или  $f(a)$  не определена. Тогда точка  $a$  называется *изолированной особой точкой (ИОТ) функции  $f$* .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2. ИОТ  $a$  для функции  $f$  называется

- *устранимой*, если существует  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$ ;
- *полосом*, если существует  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ ;
- *существенно особой точкой*, если не существует  $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ .

ТЕОРЕМА 12.1. (Об устраняемой особой точке). Для ИОТ  $a$  функции  $f$  следующие условия эквивалентны:

- (1) точка  $a$  *устраняема*;
- (2) функция  $f$  *ограничена* в некоторой проколотой окрестности  $B'(a, \delta_1)$ ,  $\delta_1 < \delta$ ;
- (3) ряд Лорана функции  $f$  в кольце  $B'(a, \delta)$  не содержит отрицательных степеней (т.е.  $c_n = 0$  при  $n < 0$ ). В этом случае говорят, что *главная часть ряда Лорана отсутствует*.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1)  $\Rightarrow$  (2). Из существования  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$  следует ограниченность  $f$  в некоторой проколотой окрестности  $B'(a, \delta_1)$  точки  $a$  ( $\delta_1 < \delta$ ), т.е.

$$\sup\{|f(z)| : z \in B'(a, \delta_1)\} = M < +\infty.$$

(2)  $\Rightarrow$  (3). Воспользуемся неравенствами Коши (11.7). Поскольку

$$M_\rho = \max_{|z-a|=\rho} |f(z)| \leq M \text{ при } \rho \in (0, \delta_1), \text{ при } n < 0 \text{ имеем:}$$

$$|c_n| \leq M_\rho \rho^{-n} \leq M \rho^{-n} \rightarrow 0 \text{ при } \rho \rightarrow 0,$$

откуда  $c_n = 0$  при  $n < 0$ .

(3)  $\Rightarrow$  (1). Очевидно, что  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = c_0 \in \mathbb{C}$ . □

СЛЕДСТВИЕ 12.1. Если  $a$  — *устраняемая особая точка*, то, определяя  $f(a) = \lim_{z \rightarrow a} f(z)$ , получаем  $f \in \mathcal{A}(B(a, \delta))$ .

ПРИМЕР 12.1. Положим  $f(z) = (\sin z)/z$  при  $z \neq 0$  и  $f(0) = 1$ . Тогда  $f$  — *целая функция*.

ТЕОРЕМА 12.2. (О полюсах). Пусть  $a \in \mathbb{C}$  — ИОТ для функции  $f \in \mathcal{A}(B'(a, \delta))$ . Следующие условия эквивалентны:

- (1)  $a$  — *полюс*;
- (2) ряд Лорана функции  $f$  в  $B'(a, \delta)$  содержит конечное (ненулевое) число отрицательных степеней (его *главная часть конечна*), т.е.  $\exists p \in \mathbb{N}$  :

$$f(z) = \frac{c_{-p}}{(z-a)^p} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-a} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n, \quad c_{-p} \neq 0.$$

В этом случае говорят, что  $a$  — *полюс функции  $f$  порядка  $p$* . При  $p = 1$  полюс называют *простым*.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1)  $\Rightarrow$  (2). По условию,  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ , поэтому  $\exists \delta_1 \in (0, \delta)$  такое, что  $f(z) \neq 0$  при  $z \in B'(a, \delta_1)$ . Рассмотрим функцию  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ , голоморфную в  $B'(a, \delta_1)$ . Ясно, что существует  $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$ , поэтому, положив  $g(a) = 0$ , получим

функцию  $g \in \mathcal{A}(B(a, \delta_1))$  (по следствию 12.1). Точка  $a$  – изолированный нуль функции  $g$  некоторого (конечного) порядка  $p \in \mathbb{N}$ . По теореме о нулях ГФ, существует  $h \in \mathcal{A}(B(a, \delta_1))$  такая, что  $g(z) = (z - a)^p h(z)$ , причем  $h(a) \neq 0$ , откуда  $h(z) \neq 0$  при  $z \in B(a, \delta_1)$ . Следовательно, определена функция  $\tilde{h}(z) = \frac{1}{h(z)} \in \mathcal{A}(B(a, \delta_1))$ .

Разложим функцию  $\tilde{h}$  в  $B(a, \delta_1)$  в ряд Тейлора:  $\tilde{h}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - a)^n$ , где  $a_0 \neq 0$ .

Тогда для функции  $f$  в  $B'(a, \delta_1)$  имеем:

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{(z - a)^p} \tilde{h}(z) = \frac{a_0}{(z - a)^p} + \frac{a_1}{(z - a)^{p-1}} + \dots$$

В силу единственности ряда Лорана, это же разложение верно и в  $B'(a, \delta)$ .

(2)  $\Rightarrow$  (1). Очевидно.  $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 12.1. Для  $f(z) = \sin(z)/z^2$  точка  $z = 0$  – простой полюс.

ЗАМЕЧАНИЕ. В обозначениях доказательства теоремы 12.2 справедливо следующее утверждение: ИОТ  $a$  – полюс порядка  $p \geq 1$  для функции  $f$ , если и только если  $a$  – нуль порядка  $p$  для функции  $g(z) = 1/f(z)$  при  $z \in B'(a, \delta_1)$ ,  $g(a) = 0$ .

Напомним, что при  $f \in \mathcal{A}(a)$  и  $f(a) \neq 0$  точка  $a$  называется нулем функции  $f$  порядка 0.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12.1. Пусть даны функции  $f_1, f_2 \in \mathcal{A}(B(a, \delta))$  и пусть точка  $a$  – нуль порядка  $p_j \in \mathbb{Z}_+$  для функции  $f_j$ ,  $j \in \{1, 2\}$ .

Положим  $f = f_1/f_2$ . Тогда при  $p_1 \geq p_2$  точка  $a$  – устранимая особая точка для  $f$  (при  $p_2 = 0$  в этой точке нет особенности), а при  $p_2 > p_1$  точка  $a$  – полюс порядка  $(p_2 - p_1)$  для  $f$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По теореме о нулях ГФ, существует число  $\delta' \in (0, \delta)$  такое, что в окрестности  $B(a, \delta')$  справедливы представления  $f_1(z) = (z - a)^{p_1} h_1(z)$ ,  $f_2(z) = (z - a)^{p_2} h_2(z)$ , причем функции  $h_1$  и  $h_2$  голоморфны и не обращаются в ноль в  $B(a, \delta')$ , т.е. функция  $h(z) = \frac{h_1(z)}{h_2(z)}$  тоже голоморфна в  $B(a, \delta')$ .

При  $p_1 \geq p_2$  функция  $f$  имеет вид  $f(z) = (z - a)^{p_1 - p_2} h(z)$ , поэтому существует конечный  $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ , так что точка  $a$  – устранима для  $f$ .

При  $p_1 < p_2$  функция  $f$  имеет вид  $f(z) = \frac{h(z)}{(z - a)^{p_2 - p_1}}$ , откуда точка  $a$  – полюс порядка  $(p_2 - p_1)$  для  $f$  по доказанному в теореме 12.2.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 12.2. ИОТ  $a$  функции  $f \in \mathcal{A}(B'(a, \delta))$  является существенно особой, если и только если ряд Лорана функции  $f$  в  $B'(a, \delta)$  содержит бесконечное число ненулевых слагаемых в главной части (т.е. существует бесконечно много  $n < 0$  таких, что  $c_n \neq 0$ ).

УПРАЖНЕНИЕ 12.2. Для  $f(z) = e^{1/z}$  точка  $z = 0$  – существенно особая.

ТЕОРЕМА 12.3. (Сохоцкого). Пусть  $a \in \mathbb{C}$  – существенно особая точка для функции  $f \in \mathcal{A}(B'(a, \delta))$ . Тогда  $\forall b \in \mathbb{C}^\#$  найдется последовательность  $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset B'(a, \delta)$  с условиями  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$  и  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = b$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По теореме 12.1, функция  $f$  не может быть ограниченной ни в какой проколотой окрестности  $B'(a, r)$ ,  $r \in (0, \delta)$  (иначе  $a$  была бы устранимой для  $f$ ). Так что в условиях нашей теоремы случай  $b = \infty$  очевиден.

Зафиксируем теперь произвольное  $b \in \mathbb{C}$ . Если  $\forall r \in (0, \delta)$  найдется такое  $z_r \in B'(a, r)$ , что  $f(z_r) = b$ , то всё доказано.

Пусть теперь  $\exists r_0 \in (0, \delta)$  такое, что  $f(z) \neq b$  в  $B'(a, r_0)$ . Рассмотрим функцию  $g(z) = 1/(f(z) - b) \in \mathcal{A}(B'(a, r_0))$ , для которой точка  $a$  – существенно особая (проверить!). По доказанному, найдется  $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset B'(a, r_0) \subset B'(a, \delta)$  с условиями  $a_n \rightarrow a$  и  $g(a_n) \rightarrow \infty$  при  $n \rightarrow +\infty$ . Откуда  $f(a_n) \rightarrow b$  при  $n \rightarrow +\infty$ .  $\square$

### Лемма Шварца. Конформные изоморфизмы круговых областей.

**ТЕОРЕМА 12.4.** (Лемма Шварца). Пусть  $B_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$  – единичный круг и  $f \in \mathcal{A}(B_1)$ . Пусть  $f(0) = 0$  и  $|f(z)| \leq 1$  при всех  $z \in B_1$ . Тогда  $|f(z)| \leq |z|$  для всех  $z \in B_1$  и, следовательно,  $|f'(0)| \leq 1$ .

Если найдется  $z_1 \in B_1$  такое, что  $z_1 \neq 0$  и  $|f(z_1)| = |z_1|$ , то найдется  $\theta \in (-\pi, \pi]$  с условием  $f(z) = e^{i\theta}z$  для всех  $z \in B_1$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Определим функцию  $g(z) = f(z)/z$ , имеющую устранимую особую точку  $z = 0$ . Полагая  $g(0) = f'(0)$ , получаем  $g \in \mathcal{A}(B_1)$ .

Фиксируем  $\varepsilon \in (0, 1)$ , и в круге  $B(0, 1 - \varepsilon)$  к функции  $g$  применим принцип максимума модуля:

$$|g(z)| \leq \|g\|_{\partial B(0, 1 - \varepsilon)} \leq \frac{1}{1 - \varepsilon}, \quad z \in B(0, 1 - \varepsilon).$$

Фиксируя  $z \in B_1$  и устремляя  $\varepsilon$  к нулю, получаем, что  $|g(z)| \leq 1$  для всех  $z \in B_1$ . Следовательно,  $|f(z)| \leq |z|$  при всех  $z \in B_1$ .

Если же найдется  $z_1 \in B_1 \setminus \{0\}$  с условием  $|f(z_1)| = |z_1|$ , то  $|g(z_1)| = 1$ . Вновь применяя принцип максимума модуля в кругах  $B(0, 1 - \varepsilon)$  и устремляя  $\varepsilon$  к нулю, получаем, что  $g(z) \equiv g(z_1) = e^{i\theta}$  в  $B_1$  (для некоторого  $\theta \in (-\pi, \pi]$ ). Отсюда  $f(z) = e^{i\theta}z$  при всех  $z \in B_1$ .  $\square$

**СЛЕДСТВИЕ 12.3.** Пусть  $D_1$  и  $D_2$  – круговые области в  $\mathbb{C}^\#$  (т.е. открытые круги или полуплоскости, или внешности замкнутых кругов в  $\mathbb{C}^\#$ ). Если функция  $f$  является конформным изоморфизмом  $D_1$  на  $D_2$ , то  $f$  – ДЛО.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $a_j \in D_j$ ,  $j \in \{1, 2\}$ , причем  $a_2 = f(a_1)$ . Существуют ДЛО  $\Lambda_j : B_1 \xrightarrow{\text{на}} D_j$  со свойством  $\Lambda_j(0) = a_j$ ,  $j = 1, 2$ .

Рассмотрим голоморфную функцию  $g = \Lambda_2^{-1} \circ f \circ \Lambda_1 : B_1 \xrightarrow{\text{на}} B_1$  (воспользоваться её непрерывностью и теоремой об устранимой особой точке). Она удовлетворяет условиям леммы Шварца, поэтому  $|g(z)| \leq |z|$  для всех  $z \in B_1$ . Аналогично,  $g^{-1}$  голоморфна и удовлетворяет условиям леммы Шварца, поэтому  $|g^{-1}(z)| \leq |z|$  при всех  $z \in B_1$ , что эквивалентно условиям  $|z| \leq |g(z)|$  при всех  $z \in B_1$ . Следовательно,  $|g(z)| = |z|$ , и тогда  $g(z) = e^{i\theta}z$  для некоторого  $\theta \in (-\pi, \pi)$ . В частности,  $g$  – ДЛО. Но тогда  $f = \Lambda_2 \circ g \circ \Lambda_1^{-1}$  – тоже ДЛО, что и требовалось.  $\square$

### Изолированная особая точка $z = \infty$ .

Назовем область  $B_{z_0}(\infty, \delta) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| > 1/\delta\} \cup \{\infty\}$  (соответственно,  $B'_{z_0}(\infty, \delta) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| > 1/\delta\}$ ) –  $\delta$ -окрестностью точки  $\infty$  в  $\mathbb{C}^\#$  (соответственно, проколотой  $\delta$ -окрестностью точки  $\infty$ ) с антицентром  $z_0$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.3.** Пусть функция  $f$  определена в окрестности  $B_{z_0}(\infty, \delta)$  точки  $\infty$  и при этом существует конечный  $\lim_{z \rightarrow \infty} z(f(z) - f(\infty)) =: f'(\infty)$ . Тогда этот предел называется комплексной производной функции  $f$  в точке  $\infty$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.4.** Если  $f \in \mathcal{A}(B'_{z_0}(\infty, \delta))$ , то точка  $\infty$  всегда по определению является ИОТ для  $f$  (даже если существует  $f'(\infty)$ ). ИОТ  $\infty$  для функции  $f$  называется

- устранимой, если  $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \in \mathbb{C}$ ;
- полюсом, если  $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$ ;
- существенно особой точкой, если  $\nexists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ .

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12.2.** Теоремы 12.1, 12.2, 12.3 с естественными изменениями остаются справедливыми и для случая  $a = \infty$ : надо только называть главной частью ряда Лорана  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(z - z_0)^n$  для  $f$  в  $B'_{z_0}(\infty, \delta)$  сумму его натуральных степеней.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.3.** Дать определение порядка полюса в точке  $\infty$  и доказать его независимость от антицентра  $z_0$ .

### Вычет в ИОТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.5. Пусть  $a \in \mathbb{C}$  – ИОТ функции  $f \in \mathcal{A}(B'(a, R))$ ,  $R > 0$ . При  $\rho \in (0, R)$  положим  $\Gamma_\rho^+ = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = \rho\}^+ = \partial^+ B(a, \rho)$ . Тогда *вычетом функции  $f$  в точке  $a$*  называется величина

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho^+} f(z) dz.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12.3. Пусть  $(*) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$  – ряд Лорана функции  $f$  в  $B'(a, R)$ . Тогда  $\operatorname{res}_a f = c_{-1}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ряд  $(*)$  сходится равномерно внутри  $B'(a, R)$ , в частности, на  $\partial B(a, \rho)$  для всякого  $\rho \in (0, R)$ . Интегрируя почленно и пользуясь свойством ортогональности степеней, получаем требуемое.  $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ. Из этого предложения, в частности, следует корректность определения вычета функции в точке.

СЛЕДСТВИЕ 12.3.1. Если  $a \in \mathbb{C}$  – устранимая для  $f$ , то  $\operatorname{res}_a f = 0$ .

СЛЕДСТВИЕ 12.3.2. Пусть  $a \in \mathbb{C}$  – полюс порядка  $p$  для функции  $f \in \mathcal{A}(B'(a, R))$ . Тогда  $\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(p-1)!} \lim_{z \rightarrow a} ((z-a)^p f(z))^{(p-1)}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если  $\sum_{n=-p}^{+\infty} c_n (z-a)^n$  – ряд Лорана функции  $f$  в  $B'(a, R)$ , то

$$\sum_{n=-p}^{+\infty} c_n (z-a)^{n+p} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{n-p} (z-a)^n$$

– ряд Тейлора для функции  $g(z) = (z-a)^p f(z) \in \mathcal{A}(B(a, R))$  (доопределенной  $g(a) = c_{-p}$ ). Дифференцируя почленно последний ряд, получаем:

$$((z-a)^p f(z))^{(p-1)} = (p-1)! c_{-1} + (z-a) \cdot h(z), \quad h(z) \in \mathcal{A}(B(a, R)).$$

Переходя к пределу при  $z \rightarrow a$ , деля на  $(p-1)!$  и пользуясь предложением 12.3, получаем требуемое.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 12.3.3. Пусть  $f(z) = \frac{f_1(z)}{f_2(z)}$ , где  $f_1, f_2 \in \mathcal{A}(B(a, R))$ . Пусть  $f_1(a) \neq 0$ , т.е. порядок нуля функции  $f_1$  в точке  $a$  равен 0. Пусть  $f_2(a) = 0$ , но  $f_2'(a) \neq 0$ , т.е. порядок нуля функции  $f_2$  в точке  $a$  равен 1. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{f_1(a)}{f_2'(a)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из условий вытекает, что функция  $f$  имеет в точке  $a$  полюс порядка  $p = 1$ . Пользуясь следствием 12.3.2, имеем:

$$\operatorname{res}_a f = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{f_1(z)}{f_2(z)} = f_1(a) \lim_{z \rightarrow a} \frac{z-a}{f_2(z) - f_2(a)} = \frac{f_1(a)}{f_2'(a)}.$$

$\square$

ЗАМЕЧАНИЕ. Если  $a \in \mathbb{C}$  – существенно особая точка для  $f \in \mathcal{A}(B'(a, R))$ , то какой-то специальной формулы для вычисления вычета в этой точке нет, однако справедливо следующее утверждение.

УПРАЖНЕНИЕ 12.4. Если функция  $f$  – четная относительно ИОТ  $a \in \mathbb{C}$ , т.е.  $f(a+z) = f(a-z)$  при всех  $z \in B'(0, R)$ , то коэффициенты ряда Лорана  $f$  в  $B'(a, R)$  с нечетными номерами равны 0. В частности,  $\operatorname{res}_a f = c_{-1} = 0$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.6. Пусть точка  $\infty$  является ИОТ для функции  $f \in \mathcal{A}(V)$ , где  $V = \{r < |z - z_0| < \infty\}$  – проколота окрестность точки  $\infty$  ( $z_0 \in \mathbb{C}$ ,  $r \geq 0$ ). Пусть  $\Gamma_\rho^+ = \{|z - z_0| = \rho\}^+$  при  $\rho \in (r, +\infty)$ . Тогда вычет функции  $f$  в точке  $\infty$  определяется по формуле

$$\operatorname{res}_\infty f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho^+} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho^-} f(z) dz.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12.4. Пусть  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - z_0)^n$  – ряд Лорана функции  $f$  в кольце  $V = \{r < |z - z_0| < \infty\}$ . Тогда  $\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Аналогично доказательству предложения 12.3. □

УПРАЖНЕНИЕ 12.5. Найти формулы (аналогичные следствию 12.3.2) для вычисления  $\operatorname{res}_\infty f$  в случае, когда функция  $f$  имеет в точке  $\infty$  полюс порядка  $p \in \mathbb{N}$ .

ЗАМЕЧАНИЕ. Функция  $f(z) = \frac{1}{z}$  имеет в точке  $\infty$  устранимую особую точку, но  $\operatorname{res}_\infty f = -1 \neq 0$ , поэтому утверждение следствия 12.3.1 неверно при  $a = \infty$ .

**13. Лекция 13. Теорема Коши о вычетах. Примеры вычисления интегралов. Лемма Жордана и преобразование Фурье рациональных функций. Специальные области и функция Шварца.**

**Теорема Коши о вычетах.**

ТЕОРЕМА 13.1. (Теорема Коши о вычетах). Пусть  $D$  – допустимая область в  $\mathbb{C}$ ,  $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_J\} \subset D$ ,  $J \in \mathbb{N}$ . Пусть функция  $f$  непрерывна на  $\bar{D} \setminus \mathfrak{A}$  и  $f \in \mathcal{A}(D \setminus \mathfrak{A})$ . Тогда

$$\int_{\partial^+ D} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^J \operatorname{res}_{a_j} f.$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Мы докажем эту теорему для простых областей, поскольку в доказательстве будет использоваться интегральная теорема Коши, которая была доказана нами только для простых областей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для  $j \in \{1, \dots, J\}$  пусть  $V_j = \{0 < |z - a_j| < R_j\}$  – кольцо, лежащее в  $D \setminus \mathfrak{A}$ . Пусть  $\Sigma_j = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n^j (z - a_j)^n$  – ряд Лорана функции  $f$  в  $V_j$  и пусть

$$f_j(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n^j (z - a_j)^n$$

– сумма главной части  $\Sigma_j^-$  ряда Лорана  $\Sigma_j$  функции  $f$  в  $V_j$ .

Из определения области сходимости обобщенного степенного ряда  $\Sigma_j$  вытекает, что  $f_j \in \mathcal{A}(\mathbb{C} \setminus \{a_j\})$ .

Положим  $f_0(z) = f(z) - \sum_{j=1}^J f_j(z)$ . Функция  $f_0$ , очевидно, непрерывна в  $\bar{D} \setminus \mathfrak{A}$  и голоморфна в  $D \setminus \mathfrak{A}$ . При этом в точках  $a_j$ ,  $j = 1, \dots, J$ , функция  $f_0$  имеет устранимые особые точки. Следовательно,  $f_0$  непрерывна в  $\bar{D}$  и  $f_0 \in \mathcal{A}(D)$  (после "стирания" особенностей). Поэтому  $\int_{\partial^+ D} f_0(z) dz = 0$  по интегральной теореме Коши. В силу аддитивности интеграла,

$$\int_{\partial^+ D} f(z) dz = \int_{\partial^+ D} f_0(z) dz + \sum_{j=1}^J \int_{\partial^+ D} f_j(z) dz = \sum_{j=1}^J \int_{\partial^+ D} f_j(z) dz,$$

поэтому для завершения доказательства теоремы достаточно показать, что

$$\int_{\partial^+ D} f_j(z) dz = 2\pi i c_{-1}^j = 2\pi i \operatorname{res}_{a_j} f.$$

Поскольку ряд  $\Sigma_j^-$  сходится равномерно внутри  $\mathbb{C} \setminus \{a_j\}$ , его можно почленно интегрировать на  $\partial D$ . Пользуясь формулой (Н-Л), имеем:

$$\int_{\partial^+ D} f_j(z) dz = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{\partial^+ D} c_{-n}^j (z - a_j)^{-n} dz = \int_{\partial^+ D} \frac{c_{-1}^j}{z - a_j} dz = 2\pi i c_{-1}^j.$$

Последнее равенство для простых областей вытекает из предложения 8.1. Теорема доказана.  $\square$

ТЕОРЕМА 13.2. (Теорема Коши о полной сумме вычетов). Пусть  $J \in \mathbb{N}$ ,  $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_J\} \subset \mathbb{C}$ , и функция  $f \in \mathcal{A}(\mathbb{C} \setminus \mathfrak{A})$ . Тогда

$$\sum_{j=1}^J \operatorname{res}_{a_j} f + \operatorname{res}_{\infty} f = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно применить предыдущую теорему в области  $B(0, R)$ , где  $R \in (\max_{1 \leq j \leq J} |a_j|, +\infty)$ , и воспользоваться определением  $\operatorname{res}_{\infty} f$ .  $\square$

**Примеры вычисления интегралов.**

ПРИМЕР 13.1. Вычислим интеграл  $I = \int_{\{|z|=4\}^+} \operatorname{ctg} z \, dz$ . Все ИОТ Функции  $f(z) = \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}$  – полюса первого порядка в точках  $a_k = \pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Пользуясь следствием 12.3.3, находим  $\operatorname{res}_{a_k} f = 1$  для всех  $k$ . В области  $\{|z| < 4\}$  лежат ИОТ  $a_{-1}, a_0, a_1$ , поэтому  $I = 2\pi i \cdot 3 = 6\pi i$ .

ПРИМЕР 13.2. Пусть  $I = \int_{\{|z|=1\}^+} \frac{dz}{\sin(1/z)}$ . В области  $\{|z| < 1\}$  функция  $f(z) = 1/\sin(1/z)$  имеет счетное число полюсов  $z_k = 1/(\pi k)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , поэтому в ней теорема Коши о вычетах неприменима. Но так как  $f \in \mathcal{A}(\{1/\pi < |z| < +\infty\})$ , то  $I$  можно вычислить по формуле  $I = -2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f$ . Здесь  $\infty$  – простой полюс для  $f$  (провести оставшееся вычисление самостоятельно).

ПРИМЕР 13.3. Пусть  $R$  – рациональная функция двух переменных, такая, что функция  $f(t) = R(\cos t, \sin t)$  непрерывна на  $\mathbb{R}$ . Требуется найти  $I = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt$ .

Пусть  $z = e^{it}$ . Тогда  $\cos(nt) = \frac{1}{2}(z^n + \frac{1}{z^n})$ ,  $\sin(nt) = \frac{1}{2i}(z^n - \frac{1}{z^n})$ . Подставляя эти выражения в  $R(\cos t, \sin t)$ , получаем рациональную функцию переменной  $z$ , которую обозначим через  $\tilde{R}$ . Легко видеть, что  $dt = \frac{dz}{iz}$ , поэтому

$$I = \int_{\{|z|=1\}^+} \tilde{R}(z) \frac{dz}{iz}.$$

Подынтегральная функция не имеет особых точек на  $\{|z| = 1\}$ , а в области  $\{|z| < 1\}$  у неё конечное число полюсов, поэтому этот интеграл можно вычислить, используя теорему Коши о вычетах.

ПРИМЕР 13.4. Пусть  $P_n$  и  $Q_m$  – многочлены (от комплексной переменной) степени  $n$  и  $m$  соответственно, причем  $m \geq n + 2$  и  $Q_m(x) \neq 0$  при  $x \in \mathbb{R}$ . Пусть  $f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$

и требуется вычислить  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx$ . Пусть  $a_1, \dots, a_J$  – все различные нули  $Q_m$  в

$\Pi_+ = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ . Тогда  $I = 2\pi i \sum_{j=1}^J \operatorname{res}_{a_j} f$ .

Действительно, пусть  $R > \max_{1 \leq j \leq J} |a_j|$ . Пусть  $D_R = B(0, R) \cap \Pi_+$  – верхний полукруг,  $\Gamma_R = \{|z| = R\} \cap \{\operatorname{Im} z \geq 0\}$  – верхняя полуокружность. Тогда

$$I_0 = \int_{\partial^+ D_R} f(z) \, dz = \int_{-R}^R f(x) \, dx + \int_{\Gamma_R^+} f(z) \, dz = I_1 + I_2.$$

По теореме Коши о вычетах, интеграл  $I_0$  равен  $2\pi i \sum_{j=1}^J \operatorname{res}_{a_j} f$ . При этом интеграл  $I_1$  при  $R \rightarrow +\infty$  стремится к  $I$ , а интеграл  $I_2$  – к нулю в силу тривиальной оценки

$$\left| \int_{\Gamma_R^+} f(z) \, dz \right| = O(1/R^2) \cdot \pi R = O(1/R).$$



**Лемма Жордана.**

ЛЕММА 13.1. (Жордана). Пусть  $R \in (0, +\infty)$ , функция  $f$  непрерывна в  $\overline{\Pi_+} \setminus B(0, R)$ , причем  $\lim_{\substack{z \rightarrow \infty \\ z \in \Pi_+}} f(z) = 0$ . Тогда  $\forall \lambda > 0$  имеем:

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{C_r^+} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0,$$

где  $C_r^+ = \{ z = re^{it} \mid t \in [0, \pi] \}^+$  – верхняя полуокружность.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\omega(r) = \|f\|_{[C_r^+]}$ , тогда по условию  $\omega(r) \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$ .

Фиксируем  $r > R$ . Если  $z = z(t) = re^{it} = r(\cos t + i \sin t)$ , то  $|e^{i\lambda z}| = e^{-\lambda r \sin t}$ . На отрезке  $[0, \pi/2]$  функция  $h(t) = \sin t$  выпукла вверх, поэтому выполняется неравенство  $\sin t \geq 2t/\pi$ . Следовательно, на отрезке  $[0, \pi/2]$  справедлива оценка

$$e^{-\lambda r \sin t} \leq e^{-\lambda r 2t/\pi}. \quad (13.1)$$

Оценим теперь интересующий нас интеграл:

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_r^+} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| &= \left| \int_0^\pi f(z(t)) e^{i\lambda z(t)} i r e^{it} dt \right| \leq \omega(r) \int_0^\pi e^{-\lambda r \sin t} r dt = \\ &= 2r \omega(r) \int_0^{\pi/2} e^{-\lambda r \sin t} dt \stackrel{(13.1)}{\leq} 2r \omega(r) \int_0^{\pi/2} e^{-\lambda r \frac{2}{\pi} t} dt = \frac{\pi}{\lambda} \omega(r) (1 - e^{-\lambda r}). \end{aligned}$$

Так как  $\lambda > 0$ , окончательно имеем:

$$\left| \int_{C_r^+} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| \leq \frac{\pi}{\lambda} \omega(r) \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0,$$

что и требовалось доказать. □

**Преобразование Фурье рациональных функций.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.1. Пусть функция  $f \in L_1(\mathbb{R})$ . Тогда ее преобразование Фурье определяется следующим образом:

$$\tilde{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Если функция  $f$  – четная (нечетная), то функция  $\tilde{f}$  – тоже четная (соответственно, нечетная).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13.1. Пусть  $P_n$  и  $Q_m$  – многочлены от  $z$  степени  $n$  и  $m$  соответственно, причем  $m \geq n + 2$  и  $Q_m(z) \neq 0$  при  $z \in \mathbb{R}$ . Пусть  $a_1, \dots, a_J$  – различные нули  $Q_m$  в  $\Pi_+$ . Определим  $F(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ , а ее сужение на  $\mathbb{R}$  обозначим через  $f$ . Тогда для любого фиксированного  $\lambda < 0$  имеем:

$$\tilde{f}(\lambda) = \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \sum_{j=1}^J \operatorname{res}_{a_j} (f(z) e^{-i\lambda z}) =: I.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Зафиксируем произвольное  $R > \max_{1 \leq j \leq J} |a_j|$ . Для  $r > R$  определим область  $D_r = B(0, r) \cap \Pi_+$ . Тогда по теореме Коши о вычетах

$$\int_{\partial^+ D_r} f(z) e^{-i\lambda z} dz = 2\pi i \sum_{j=1}^J \operatorname{res}_{a_j} (f(z) e^{-i\lambda z}) = \sqrt{2\pi} I.$$

Положим  $C_r = \{z = re^{it} \mid t \in [0, \pi]\}$ . Поскольку  $\partial D = [-r, r] \cup C_r$ , имеем:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-r}^r f(x) e^{-i\lambda x} dx = \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\partial^+ D_r} f(z) e^{-i\lambda z} dz - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{C_r^+} f(z) e^{-i\lambda z} dz \right) = \\ &= I - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{C_r^+} f(z) e^{-i\lambda z} dz = I, \end{aligned}$$

где последнее равенство справедливо в силу леммы Жордана.  $\square$

ПРИМЕР 13.5. Пусть  $f(z) = \frac{1}{z^2 + 9}$ . Тогда при  $\lambda < 0$  находим:

$$\tilde{f}(\lambda) = \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{res}_{3i} \left( \frac{1}{z^2 + 9} e^{-i\lambda z} \right) = \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{3\lambda}}{6i} = \frac{\sqrt{2\pi}}{6} e^{3\lambda}.$$

Чтобы найти  $\tilde{f}(\lambda)$  при  $\lambda > 0$ , достаточно заметить, что  $f$  четная. Окончательно,  $\tilde{f}(\lambda) = \frac{\sqrt{2\pi}}{6} e^{-3|\lambda|}$ .

### "Специальные" области. Функция Шварца.

Вводимое ниже понятие специальной области позволяет значительно расширить возможности теоремы Коши о вычетах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.2. Жорданова область  $D$  в  $\mathbb{C}$  называется *специальной*, если найдется конечное множество  $\Sigma \subset D$  и функция  $S \in \mathcal{A}(D \setminus \Sigma)$ , непрерывная на  $\bar{D} \setminus \Sigma$ , для которой  $S(z) = \bar{z}$  при всех  $z \in \partial D$ . Такая функция  $S$  единственна и называется *функцией Шварца* области  $D$ .

ЗАМЕЧАНИЕ. Единственность функции Шварца мы докажем в следующем семестре, например, с помощью теоремы Римана.

Простейшим примером специальной области служит любой круг  $B(a, r)$ , для которого  $(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = r^2$ , откуда  $S(z) = r^2 / (z - a) + \bar{a}$ ,  $\Sigma = \{a\}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 13.1. Доказать, что всякая жорданова область, содержащая отрезок прямой на своей границе, не может быть специальной.

Покажем, как используется функция Шварца при вычислении интегралов.

ПРИМЕР 13.6. Функция  $S(z) = \frac{4}{z}$  является функцией Шварца области  $B(0, 2)$ , поэтому

$$\int_{\{|z|=2\}^+} \bar{z}^2 \operatorname{tg} z dz = \int_{\{|z|=2\}^+} \frac{16}{z^2} \operatorname{tg} z dz,$$

где интеграл справа легко считается с помощью теоремы Коши о вычетах, в то время как слева под интегралом стоит всюду неголоморфная функция.

УПРАЖНЕНИЕ 13.2. Вычислить интегралы:

$$\int_{|z-i|=3} \cos(\bar{z}) dz, \quad \int_{|z+i|=1} |z|^2 \ln(iz) dz.$$

УПРАЖНЕНИЕ 13.3. Пусть  $D$  – произвольная ограниченная область в  $\mathbb{C}$  и  $f \in \mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D})$ . Если  $f(\partial D) \subset \mathbb{R}$ , то  $f \equiv \text{const}$  в  $\bar{D}$ .

Указание: использовать ДЛЮ, принцип максимума модуля и теорему Коши-Римана. Из упражнения 13.3 вытекают два важных факта про специальные области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13.2. Пусть  $D$  – специальная область, и пусть функция Шварца  $S$  этой области имеет в  $D$  одну особую точку  $a$  – полюс первого порядка. Тогда  $D$  – круг с центром в точке  $a$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $S(z) = h(z) + \frac{\lambda}{z-a}$ , где  $h \in \mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D})$ ,  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Тогда при  $z \in \partial D$  имеем:

$$0 < |z-a|^2 = (\bar{z}-\bar{a})(z-a) = \left(h(z) + \frac{\lambda}{z-a} - \bar{a}\right)(z-a) = (h(z) - \bar{a})(z-a) + \lambda.$$

Поскольку функция  $H(z) = (h(z) - \bar{a})(z-a) + \lambda \in \mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D})$  принимает на  $\partial D$  вещественные значения, имеем  $H(z) \equiv C > 0$  в  $\bar{D}$ , откуда  $|z-a| = \sqrt{H(z)} \equiv \sqrt{C}$  на  $\partial D$  и, следовательно,  $D$  – круг радиуса  $\sqrt{C}$  с центром в точке  $a$ .  $\square$

Аналогично доказывается следующее утверждение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13.3. В указанных выше обозначениях для всякой специальной области  $D$  множество  $\Sigma$  не пусто.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.3. Специальная область  $D$  называется неванлинновской, если её функция Шварца не имеет в  $D$  других особых точек, кроме полюсов.

ПРИМЕР 13.7. Пусть  $B = B(a, r)$  – круг, где  $a \in (0, +\infty)$  и  $0 < r \leq a$ . Пусть  $D$  – образ круга  $B$  при отображении  $w = z^2$ . Отметим, что при  $r = a$  область  $D$  (кардиоида!) имеет негладкую границу – точку возврата в 0. Докажем, что  $D$  – неванлинновская область. Действительно, если  $z \in \partial B$  и  $w = z^2$ , то  $z = s(w)$ ,  $\bar{z} = s(\bar{w})$  (через  $s(w)$  мы обозначаем главное значение  $\sqrt{w}$ , являющееся функцией класса  $\mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D})$ ). Отсюда при  $w \in \partial D$  имеем:

$$(s(\bar{w}) - a)(s(w) - a) = r^2 \Leftrightarrow \bar{w} = \left(a + \frac{r^2}{s(w) - a}\right)^2 \Leftrightarrow \bar{w} = \left(a + \frac{r^2(s(w) + a)}{w - a^2}\right)^2,$$

где последняя функция Шварца (для  $D$ ) имеет в  $D$  только одну особую точку  $w = a^2$  – полюс второго порядка. Аналогично ( $\forall p \in \{3, 4, \dots\}$ ) строится неванлинновская область  $D$  с одним полюсом порядка  $p$  у её функции Шварца.

УПРАЖНЕНИЕ 13.4. Привести пример специальной области  $D$ , у которой функция Шварца имеет в  $D$  только одну особую точку – существенно особую.

УПРАЖНЕНИЕ 13.5. \* Привести пример неванлинновской области  $D$ , у которой функция Шварца имеет в  $D$  два полюса первого порядка.

УПРАЖНЕНИЕ 13.6. Пусть  $D$  – жорданова область в  $\mathbb{C}$  с кусочно-гладкой границей и  $f \in \mathcal{A}(D) \cap C^1(\bar{D})$ . Доказать, что  $2i \int_D f(z) dx dy = \int_{\partial^+ D} f(z) \bar{z} dz$ . Для неванлинновских областей  $D$  такие интегралы всегда можно вычислять с помощью вычетов.

В следующем семестре с помощью функции Шварца мы будем вычислять интегралы Пуассона, задающие решения задачи Дирихле для гармонических функций в кругах.

**14. Лекция 14. Интеграл в смысле главного значения. Вычет функции в точке относительно области. Теорема о вычетах для  $(vp) \int f$ . Примеры вычисления  $(vp) \int f$ .**

**Определение  $(vp) \int f$ .**


Пусть  $\Gamma^+$  – кусочно гладкая жорданова или замкнутая жорданова (ориентированная) кривая в  $\mathbb{C}$ . Такие кривые мы будем для краткости называть *КГ-допустимыми в  $\mathbb{C}$* . "Образ" произвольной КГ-допустимой в  $\mathbb{C}$  кривой под действием какого-либо ДЛО будем называть *КГ-допустимой кривой в  $\mathbb{C}^\sharp$* . Наиболее частый пример – положительно ориентированная вещественная ось  $\mathbb{R}^\sharp$  (дополненная одной точкой  $\infty$ ) – КГ-допустимая кривая в  $\mathbb{C}^\sharp$ , полученная, например, из стандартно ориентированной окружности  $\{|z| = 1\}^+$  под действием ДЛО  $\frac{1}{z-i} - \frac{i}{2}$  (проверить!). С другой стороны, ориентированная граница какой-либо полосы, дополненная точкой  $\infty$ , не является КГ-допустимой кривой в  $\mathbb{C}^\sharp$ .

Напомним, что через  $B(a, \delta)$  (соответственно,  $B'(a, \delta)$ ) обозначается открытый круг (соответственно, проколотый круг) с центром  $a \in \mathbb{C}$  и радиусом  $\delta > 0$ . При  $a = \infty$  полагаем  $B(a, \delta) = \{z \in \mathbb{C}^\sharp : |z| > \frac{1}{\delta}\}$  (соответственно,  $B'(a, \delta) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > \frac{1}{\delta}\}$ ).

Пусть  $\mathfrak{A}_* = \{a_1, \dots, a_J\}$  – конечное (возможно пустое) подмножество в  $[\Gamma]$  (здесь  $[\Gamma]$  – носитель  $\Gamma^+$ , причем, если  $\infty \in [\Gamma]$ , то  $\infty \in \mathfrak{A}_* \neq \emptyset$  по определению). При  $\Delta = \{\delta_1, \dots, \delta_J\}$  (где все  $\delta_j \in (0, +\infty)$ ) положим  $|\Delta| = \max\{\delta_1, \dots, \delta_J\}$ . При всех  $\Delta$  с достаточно малым  $|\Delta|$  выражение

$$\Gamma_{\mathfrak{A}_* \Delta}^+ = \Gamma^+ \setminus \left( \bigsqcup_{j=1}^J B(a_j, \delta_j) \right) \quad (14.1)$$

естественно интерпретируется как цепь (формальное конечное объединение) КГ-допустимых кривых в  $\mathbb{C}$ .



В указанных обозначениях пусть  $f : [\Gamma] \setminus \mathfrak{A}_* \rightarrow \mathbb{C}$  непрерывна. Величина

$$(vp) \int_{\Gamma^+} f(z) dz = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \int_{\Gamma_{\mathfrak{A}_* \Delta}^+} f(z) dz$$

(если указанный предел существует и конечен) называется *главным значением (value principal) интеграла* от функции  $f$  вдоль кривой  $\Gamma^+$ .

Это определение естественно распространяется на цепи КГ-допустимых кривых в  $\mathbb{C}^\sharp$  (дать определение самостоятельно).


Так, непосредственно по определению проверяется, что  $(vp) \int_{\mathbb{R}^\#} (1/z) dz = 0$  (здесь  $\mathfrak{A}_* = \{0, \infty\}$ ).

Нашей целью будет доказательство аналога теоремы Коши о вычетах для  $(vp)$ -интегралов и, в частности, доказательство теоремы существования для  $(vp)$ -интегралов. Сначала мы введем аналог понятия вычета и установим ряд его свойств.

### Вычет функции в точке относительно области.

Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ , ограниченная конечным числом попарно непересекающихся замкнутых КГ-допустимых (в  $\mathbb{C}$ ) кривых. Такие области мы будем называть КГ-допустимыми в  $\mathbb{C}$ . Образ произвольной КГ-допустимой в  $\mathbb{C}$  области под действием какого-либо ДЛО будем называть *КГ-допустимой областью в  $\mathbb{C}^\#$* . Как и ранее, через  $\partial_+^\# D$  (соответственно,  $\partial^\# D$ ) обозначается ориентированная (соответственно, топологическая) граница в  $\mathbb{C}^\#$  КГ-допустимой области в  $\mathbb{C}^\#$ . Через  ${}^\# \overline{D}$  обозначается *замыкание в  $\mathbb{C}^\#$  области  $D$*  (отметим, что термин  $D^\#$  уже занят для одноточечной компактификации области  $D$ ).

Примером КГ-допустимой области в  $\mathbb{C}^\#$  является открытая верхняя полуплоскость.



Фиксируем произвольную КГ-допустимую область  $D$  в  $\mathbb{C}^\#$  и точку  $a \in {}^\# \overline{D}$ . При всех достаточно малых  $\delta > 0$  кривая  $\gamma_\delta^+(a) = \partial^+ B(a, \delta) \cap {}^\# \overline{D}$  представляет собой связную (ориентированную) дугу окружности. Пусть при некотором  $\delta_0 > 0$  задана функция  $f: B^+(a, \delta_0) \cap {}^\# \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$ , непрерывная на указанной области определения. В этих обозначениях, выражение

$$\operatorname{res}_{(a,D)} f = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\gamma_\delta^+(a)} f(z) dz$$

(если последний предел существует и конечен) называется *вычетом функции  $f$  в точке  $a$  относительно области  $D$* .

Приведем ряд утверждений о вычислении таких вычетов.


**ЛЕММА 14.1.** *Если  $a \in D$  и функция  $f$  голоморфна в проколотой окрестности точки  $a$ , то  $\operatorname{res}_{(a,D)} f = \operatorname{res}_a f$  – обычный вычет функции  $f$  в точке  $a$ .*

**ЛЕММА 14.2.** *Пусть  $a \neq \infty$  и  $f(z) = o\left(\frac{1}{z-a}\right)$  при  $z \rightarrow a$  ( $z \in {}^\# \overline{D}$ ), или  $a = \infty$  и  $f(z) = o\left(\frac{1}{z}\right)$  при  $z \rightarrow \infty$  ( $z \in {}^\# \overline{D}$ ). Тогда  $\operatorname{res}_{(a,D)} f = 0$ .*

Доказательства этих двух лемм очевидны.

ЛЕММА 14.3. Пусть  $a \in \partial^{\#}D \cap \mathbb{C}$  является полюсом первого порядка функции  $f$ , и пусть  $\theta_a$  – абсолютная величина внутреннего угла области  $D$  в точке  $a$ . Тогда  $\operatorname{res}_{(a,D)} f = \frac{\theta_a}{2\pi} \operatorname{res}_a f$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В указанных условиях, при малых  $\delta > 0$  кривую  $\gamma_{\delta}^{+}(a)$  можно параметризовать следующим образом:  $\{z(t) = a + \delta e^{it} \mid t \in [\alpha(\delta), \beta(\delta)]\}$ , где  $\alpha(\delta) < \beta(\delta) < \alpha(\delta) + 2\pi$ , причем  $\beta(\delta) - \alpha(\delta) \rightarrow \theta_a$  при  $\delta \rightarrow 0$ .



Разложим функцию  $f$  в ряд Лорана в  $B'(a, \delta_0)$  при некотором  $\delta_0 > 0$ :

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{+\infty} c_n (z-a)^n,$$

где  $c_{-1} = \operatorname{res}_a f$ . Тогда

$$\operatorname{res}_{(a,D)} f = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\alpha(\delta)}^{\beta(\delta)} \left( \frac{c_{-1}}{\delta e^{it}} + O(1) \right) \delta e^{it} i dt = \frac{\theta_a c_{-1}}{2\pi}.$$

Лемма доказана.  $\square$

Для полюсов более высокого порядка полезно следующее утверждение, которое доказывается аналогично предыдущей лемме.

УПРАЖНЕНИЕ 14.1. Пусть  $D = \Pi_+$  и точка  $a \in \mathbb{R}$  является полюсом порядка  $p > 1$  функции  $f$ . Тогда  $\operatorname{res}_{(a,D)} f$  существует если и только если главная часть ряда Лорана функции  $f$  в проколотой окрестности точки  $a$  содержит только нечетные степени  $z-a$ . В указанном случае всегда

$$\operatorname{res}_{(a,D)} f = \frac{1}{2} \operatorname{res}_a f.$$

Следующее утверждение является переформулировкой леммы 13.1 (Жордана).

ЛЕММА 14.4. Пусть  $R \in (0, +\infty)$ , функция  $f$  непрерывна на  $\overline{\Pi_+} \setminus B(0, R)$ , причем  $\lim_{\substack{z \rightarrow \infty \\ z \in \Pi_+}} f(z) = 0$ . Тогда для любого фиксированного  $\lambda > 0$  имеем

$$\operatorname{res}_{(\infty, \Pi_+)} (f(z)e^{i\lambda z}) = 0.$$


УПРАЖНЕНИЕ 14.2. Для области  $D = (B(2, 2) \setminus \overline{B(1, 1)}) \cap \{\operatorname{Im}(z) > 0\}$  и функции  $f(z) = \frac{1}{z^2}$  вычислить (по определению)  $\operatorname{res}_{(0,D)} f$ . Как следствие найти  $(vp) \int_{\partial^+ D} f(z) dz$ .

**Теорема о вычетах для  $(vp) \int$ .**

ТЕОРЕМА 14.1. Пусть  $D$  – КГ-допустимая область в  $\mathbb{C}^\sharp$  и  $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_N\}$  – конечное (возможно, пустое) подмножество в  ${}^\sharp\bar{D}$  (если  $\infty \in {}^\sharp\bar{D}$ , то  $\infty \in \mathfrak{A} \neq \emptyset$  по определению). Пусть  $f: {}^\sharp\bar{D} \setminus \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \in \mathcal{A}(D \setminus \mathfrak{A})$  и  $f$  непрерывна на  ${}^\sharp\bar{D} \setminus \mathfrak{A}$ . Тогда справедлива формула:

$$(vp) \int_{\partial_+^\sharp D} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^N \operatorname{res}_{(a_n, D)} f,$$

где имеется в виду, что  $(vp) \int$  слева существует, если и только если каждый вычет справа существует, и в этом случае выполняется равенство.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим  $\mathfrak{A}_* = \mathfrak{A} \cap \partial^\sharp D$ . Если  $\mathfrak{A}_* = \emptyset$  (откуда, в частности,  $\infty \notin \partial^\sharp D$ ), то утверждение теоремы непосредственно вытекает из стандартной теоремы Коши о вычетах (возможный здесь случай  $\infty \in D$  рассмотреть отдельно, самостоятельно!). Пусть далее  $\mathfrak{A}_* \neq \emptyset$  (если  $\infty \in \partial^\sharp D$ , то  $\infty \in \mathfrak{A}_*$ ). Без ограничения общности будем считать, что  $\mathfrak{A}_* = \{a_1, \dots, a_J\}$ , где  $J \leq N$ . Пусть, как и ранее,  $\Delta = \{\delta_1, \dots, \delta_J\}$ . Для любого  $\Delta$  с достаточно малым  $|\Delta|$  определим область  $D_{\mathfrak{A}_* \Delta} = D \setminus \bigcup_{j=1}^J \overline{B(a_j, \delta_j)}$ .

Напомним, что обозначение  $(\partial_+^\sharp D)_{\mathfrak{A}_* \Delta}$  определено выше в формуле 14.1.

Для функции  $f$  в области  $D_{\mathfrak{A}_* \Delta}$  применима стандартная теорема Коши о вычетах:

$$\int_{\partial_+^\sharp (D_{\mathfrak{A}_* \Delta})} f(z) dz = \int_{(\partial_+^\sharp D)_{\mathfrak{A}_* \Delta}} f(z) dz - \sum_{j=1}^J \int_{\gamma_{\delta_j}^+(a_j)} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=J+1}^N \operatorname{res}_{a_n} f,$$

где последняя сумма считается равной 0 в случае  $J = N$ . Остается  $|\Delta|$  устремить к 0. Теорема доказана.  $\square$

**Примеры вычисления  $(vp) \int$ .**

ПРИМЕР 14.1. Вычислить  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1 - \cos(2x)) dx}{x^2(x^2 + 1)}$ .

Положим  $D = \Pi_+$ ,  $f(z) = (1 - e^{2iz})/(z^2(z^2 + 1))$ . Тогда (абсолютно сходящийся) интеграл  $I$  является вещественной частью  $(vp)$ -интеграла  $I_1 = (vp) \int_{\partial_+^\sharp D} f(z) dz$ . В

обозначениях теоремы 14.1 имеем  $\mathfrak{A} = \{a_1 = 0, a_2 = i, a_3 = \infty\}$ . Применяя леммы 14.2 - 14.4 ( $a_1$  и  $a_2$  – полюса первого порядка функции  $f$ ), находим  $I_1 = 2\pi i (2^{-1} \operatorname{res}_{a_1} f + \operatorname{res}_{a_2} f) = \pi(1 + e^{-2})$ . Откуда  $I = \pi(1 + e^{-2})$ .

ПРИМЕР 14.2. Вычислить  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x - \sin(x)) dx}{x^3}$ .

Пусть  $D = \Pi_+$ ,  $f(z) = (iz - e^{iz})/z^3$ . Тогда исходный (абсолютно сходящийся) интеграл является мнимой частью ( $vp$ )-интеграла  $I_1 = (vp) \int_{\partial_+^\# D} f(z) dz$ . По теореме 14.1 (при  $\mathfrak{A} = \{a_1 = 0, a_2 = \infty\}$ ), с применением леммы 14.2, леммы 14.4 и упражнения 14.1 ( $a_1$  – полюс порядка 3 функции  $f$ ), получаем  $I_1 = 2\pi i 2^{-1} \operatorname{res}_{a_1} f = \pi i/2$ . Откуда  $I = \pi/2$ .

ПРИМЕР 14.3. Вычислить  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x) dx}{x^2 - 1}$ .

Пусть  $f(z) = \frac{\ln_*(z)}{z^2 - 1}$ , где ветвь логарифма  $\ln_*(z) = \ln|z| + i \operatorname{arg}_*(z)$  выбрана с условием  $\operatorname{arg}_*(z) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$  (т.е. с разрезом по отрицательной мнимой полуоси). Пусть  $D$  – верхняя полуплоскость. При  $\mathfrak{A} = \{-1, 0, 1, \infty\}$ , применяя теорему 14.1 и леммы 14.2 и 14.3, находим:

$$(vp) \int_{\partial_+^\# D} f(z) dz = 2\pi i \frac{1}{2} \operatorname{res}_{-1} f = \frac{\pi^2}{2}.$$

Учитывая, что  $\operatorname{Re} [(vp) \int_{-\infty}^0 f(z) dz] = I$ , получаем  $I = \frac{\pi^2}{4}$ .

УПРАЖНЕНИЕ 14.3. Вычислить  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x) dx}{(x-1)(x^2+4)}$ .

*Указание.* Для функции  $f_1(z) = \frac{(\ln_*(z))^2}{(z-1)(z^2+4)}$  в верхней полуплоскости  $D_1$  (функция  $\ln_*(z)$  определяется как в предыдущем примере) и функции  $f_2(z) = \frac{(\ln^*(z))^2}{(z-1)(z^2+4)}$  в нижней полуплоскости  $D_2$  (здесь  $\ln^*(z) = \ln|z| + i \operatorname{arg}^*(z)$ , где  $\operatorname{arg}^*(z) \in (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ , т.е. с разрезом по положительной мнимой полуоси) применяем теорему 14.1 и леммы 14.2 и 14.3). Далее складываем полученные ответы для  $\int_{\partial_+^\# D_1} f_1(z) dz$  и  $\int_{\partial_+^\# D_2} f_2(z) dz$  и учитываем, что  $f_1(z) = f_2(z)$  в левой полуплоскости (в частности, на  $(-\infty, 0)$ ). Остается воспользоваться равенством  $\operatorname{Im} (f_1(x) - f_2(x)) = -4\pi \frac{\ln(x)}{(x-1)(x^2+4)}$  на  $(0, +\infty)$ .

УПРАЖНЕНИЕ 14.4. Доказать, что преобразование Гильберта

$$f \mapsto H[f](x) = \frac{1}{\pi} (vp) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t)}{t-x} dt$$

удовлетворяет условию  $H[H[f]](x) = -f(x)$  для всякой правильной рациональной функции  $f$  без вещественных полюсов.

ЗАМЕЧАНИЕ. Формально в последнем интеграле следовало интегрировать по  $\mathbb{R}^\#$ , а не по  $\mathbb{R}$ , поскольку  $\mathbb{R}$  не является КГ-допустимой кривой в  $\mathbb{C}^\#$ .



**15. Лекция 15. Гармонические функции двух переменных. Базовые свойства. Задача Дирихле. Разложение в ряд по однородным гармоническим полиномам.**

**Базовые свойства гармонических функций (ГрФ) двух переменных.**

В этой лекции  $\mathbb{C}$  метрически отождествляется с  $\mathbb{R}_{(x,y)}^2$  ( $z = x + iy$ ).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 15.1.** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{R}^2$ ,  $h : D \rightarrow \mathbb{R}$  – функция класса  $C^2(D)$  (т.е.  $h = h(x, y)$  имеет непрерывные частные производные в  $D$  до второго порядка включительно); если при этом

$$\Delta h \equiv h_{xx} + h_{yy} = \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \equiv 0 \text{ в } D,$$

то  $h$  называется *гармонической функцией (ГрФ) в  $D$* .

Класс всех таких функций обозначается  $\mathcal{H}(D)$ .

*Замечание.* Пусть  $a \in \mathbb{C}$ . Говорят, что функция  $h$  является *гармонической в точке  $a$* , если  $\exists \delta > 0$  такое, что  $h \in \mathcal{H}(B(a, \delta))$ . Очевидно, что  $h \in \mathcal{H}(D)$  если и только если  $\forall a \in D$  функция  $h$  является гармонической в точке  $a$ .

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15.1.** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ ,  $f \in \mathcal{A}(D)$ . Тогда функции  $u(z) = \operatorname{Re} f(z)$  и  $v(z) = \operatorname{Im} f(z)$  являются гармоническими в  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Утверждение вытекает из теоремы Коши-Римана и из равенства смешанных частных производных  $u_{xy} = u_{yx}$  в  $D$ .  $\square$

Следующий пример показывает существенность требования  $h \in C^2(D)$  в определении 15.1. Рассмотрим функцию

$$h_*(x, y) = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} = \operatorname{Im}\left(-\frac{1}{2z^2}\right) \in \mathcal{H}(\mathbb{C}_b), \quad \mathbb{C}_b = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

доопределенную  $h_*(0, 0) = 0$ . Поскольку  $h_* \equiv 0$  на осях координат, имеем  $\Delta h_*|_{(0,0)} = 0$ .

Следовательно,  $\Delta h_* = 0$  во всем  $\mathbb{C}$ . Однако  $h_*$  не является гармонической в точке  $(0, 0)$ , поскольку она разрывна в этой точке.

**ТЕОРЕМА 15.1. (Связь гармоничности и голоморфности).** Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$ ,  $h \in \mathcal{H}(D)$ . Тогда  $\exists f \in \mathcal{A}(D)$  с условием  $\operatorname{Re} f = h$ . Функция  $f$  определяется единственным образом с точностью до аддитивной чисто мнимой постоянной.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Положим  $g(z) = 2\frac{\partial}{\partial z}h = h_x - ih_y \in C^1(D)$ . Тогда

$$2\frac{\partial}{\partial \bar{z}}g = \left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)(h_x - ih_y) = \Delta h \equiv 0 \text{ в } D.$$

По теореме Коши-Римана,  $g \in \mathcal{A}(D)$ .

Поскольку  $D$  – односвязна, существует п/о  $f_0(z)$  функции  $g(z)$  в  $D$ . Пусть  $f_0(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , тогда

$$h_x - ih_y = g(z) = f_0'(z) = \frac{\partial f_0}{\partial x}\Big|_z = (u_x + iv_x).$$

Следовательно,  $h_x = u_x$  и  $h_y = -v_x = u_y$ , т.е.  $\vec{\nabla}u(x, y) \equiv \vec{\nabla}h(x, y)$  (в частности,  $h \in C^\infty$ , поскольку  $u \in C^\infty$ ). Отсюда следует, что  $u(x, y) \equiv h(x, y) + C_0$ , где  $C_0$  – вещественная константа. В качестве  $f(z)$  можно взять функцию  $f_0(z) - C_0$ . Утверждение о единственности тривиально.

*Замечание 1.* Функция  $g(z)$  называется *сопряженным градиентом* функции  $h$ , поскольку  $g(z) = h_x \cdot 1 + (-h_y) \cdot i$ , а вектор  $(h_x, -h_y)$  на комплексной плоскости сопряжен вектору градиента  $(h_x, h_y)$ .

*Замечание 2.* Попутно доказали, что для произвольной вещественной функции  $h \in C^2(D)$  имеем  $4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} h \equiv \Delta h$  в  $D$ .  $\square$

**СЛЕДСТВИЕ 15.0.1.** Для любой (не обязательно односвязной) области  $D$  в  $\mathbb{C}$  выполнено включение  $\mathcal{H}(D) \subset C^\infty(D)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Имеем:  $h_x - ih_y = 2 \frac{\partial}{\partial z} h = g \in \mathcal{A}(D) \subset C^\infty(D)$ .  $\square$

**УПРАЖНЕНИЕ 15.1.** Рассмотрим  $h(z) = \ln |z| \in \mathcal{H}(\mathbb{C}_\setminus 0)$  (проверить!). Доказать, что не существует функции  $f \in \mathcal{A}(\mathbb{C}_\setminus 0)$  такой, что  $Re f = h$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 15.2.** Для  $h \in \mathcal{H}(D)$  в односвязной области  $D$  доказать потенциальность поля  $\vec{a}(x, y) = (-h_y, h_x)$  и найти его потенциал  $v$ . Тогда функция  $f(z) = h(x, y) + i v(x, y)$  подходит в качестве искомой в теореме 15.1.

**СЛЕДСТВИЕ 15.0.2.** (Внутренняя теорема единственности для ГрФ). Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{C}$ ,  $h \in \mathcal{H}(D)$ . Пусть  $K_h = \{a \in D \mid \vec{\nabla} h(a) = \vec{0}\}$  – совокупность критических точек функции  $h$  в  $D$ . Если  $K_h$  имеет в  $D$  хоть одну предельную точку, то  $h \equiv const$  в  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим функцию  $g = 2 \frac{\partial}{\partial z} h$  – сопряженный градиент функции  $h$ . Тогда

$$g(a) = h_x(a) - ih_y(a) = 0, \forall a \in K_h.$$

По теореме единственности (примененной к голоморфной функции  $g$ ), если  $K_h$  имеет предельную точку в  $D$ , то  $g(z) \equiv 0$  в  $D$ . Но тогда  $h_x \equiv 0$ ,  $h_y \equiv 0$  в  $D$ , и, значит,  $h(z) \equiv const$  в  $D$ .  $\square$

**ТЕОРЕМА 15.2.** (Теорема о среднем для ГрФ). Пусть  $D = B(a, R)$  – открытый круг ( $a \in \mathbb{C}$ ,  $0 < R < +\infty$ ),  $h \in \mathcal{H}(D) \cap C(\bar{D})$ . Тогда при любом  $r \in (0, R]$  справедливо равенство:

$$h(a) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(a, r)} h(z) |dz| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(a + re^{it}) dt. \quad (15.1)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть сначала  $r \in (0, R)$ . Найдем  $f \in \mathcal{A}(D)$  с условием  $Re f = h$ . По теореме о среднем для голоморфных функций имеем:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(a, r)} f(z) |dz|.$$

Остается взять вещественную часть от обеих частей последнего равенства.

Для случая  $r = R$  нужно перейти к пределу в равенстве (15.1) при  $r \rightarrow R-$ , используя равномерную непрерывность  $h$  на  $\bar{D}$ .  $\square$

**ТЕОРЕМА 15.3.** (Принцип минимума-максимума для ГрФ). Пусть  $D$  – ограниченная область в  $\mathbb{C}$ ,  $h \in \mathcal{H}(D) \cap C(\bar{D})$ . Тогда  $\forall z_0 \in D$  справедливы оценки:

$$\min_{z \in \partial D} h(z) \leq h(z_0) \leq \max_{z \in \partial D} h(z).$$

Если найдется  $z_0 \in D$  с условием  $h(z_0) = \min_{z \in \partial D} h(z)$  (или  $h(z_0) = \max_{z \in \partial D} h(z)$ ), то  $h \equiv const$  в  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\exists z_0 \in D$  такая, что  $h(z_0) \geq \max_{z \in \partial D} h(z)$ . Пользуясь компактностью  $\bar{D}$  и непрерывностью  $h$  на  $\bar{D}$ , мы можем без ограничения общности дополнительно считать, что  $h(z_0) = \max_{z \in \bar{D}} h(z)$ . Пусть  $R = dist(z_0, \partial D)$ , тогда  $B = B(z_0, R) \subset D$ ,  $\bar{B} \subset \bar{D}$ . Применяя теорему о среднем для  $h$  в  $B$ , нетрудно показать, что  $h(z) \equiv h(z_0)$  в  $\bar{B}$ . Поскольку  $\vec{\nabla} h = \vec{0}$  в  $B$ , по следствию 15.0.2 получаем, что  $h(z) \equiv const$  в  $D$  (и по

непрерывности,  $h(z) \equiv \text{const} = h(z_0)$  в  $\overline{D}$ ). Поэтому  $h(z_0)$  не может быть строго больше, чем  $\max_{z \in \partial D} h(z)$ , а в случае их равенства имеем  $h(z) \equiv \text{const}$  в  $\overline{D}$ , что и требовалось доказать.

Ситуация, в которой найдется  $z_0 \in D$  с условием  $h(z_0) \leq \min_{z \in \partial D} h(z)$ , сводится к рассмотренной выше заменой  $h(z)$  на  $-h(z)$ .  $\square$

**СЛЕДСТВИЕ 15.0.3.** (Граничная теорема единственности для ГрФ). Пусть  $D$  – ограниченная область в  $\mathbb{C}$ , а функции  $h_1$  и  $h_2$  принадлежат  $\mathcal{H}(D) \cap C(\overline{D})$ . Если  $h_1 \equiv h_2$  на  $\partial D$ , то  $h_1 \equiv h_2$  в  $\overline{D}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Применяем теорему 15.3 к функции  $h(z) = h_1(z) - h_2(z)$ .  $\square$

**ТЕОРЕМА 15.4.** (Инвариантность гармоничности при голоморфной замене переменных). Пусть  $D$  и  $\Omega$  – области в  $\mathbb{C}$ ,  $k : D \rightarrow \Omega$ ,  $k \in \mathcal{A}(D)$ . Пусть  $H = H(w) \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Тогда  $h(z) = H(k(z)) \in \mathcal{H}(D)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Фиксируем произвольную точку  $z_0 \in D$ ,  $w_0 = k(z_0) \in \Omega$ . Выберем  $\delta > 0$  и  $\varepsilon > 0$  такие, что  $B = B(z_0, \delta) \subset D$ ,  $k(B) \subset B(w_0, \varepsilon) \subset \Omega$ . По теореме 15.1 найдется функция  $F(w) \in \mathcal{A}(B(w_0, \varepsilon))$  с условием  $\text{Re } F = H$  в  $B(w_0, \varepsilon)$ . Тогда  $f(z) = F(k(z)) \in \mathcal{A}(B)$  как композиция голоморфных функций. Отсюда  $h = \text{Re } f \in \mathcal{H}(B)$ . В силу произвольности  $z_0 \in D$  получаем, что  $h(z) = H(k(z)) \in \mathcal{H}(D)$ .  $\square$


### Задача Дирихле для ГрФ.

Пусть  $D$  – ограниченная область в  $\mathbb{C}$ ,  $h_0 \in C(\partial D)$  – вещественнозначная функция. Требуется найти функцию  $h \in \mathcal{H}(D) \cap C(\overline{D})$  такую, что  $h|_{\partial D} = h_0$ .

*Замечание.* Сформулированная задача называется *задачей Дирихле (ЗД)* для ГрФ. По следствию 15.0.3, если ЗД разрешима для *граничной функции*  $h_0 \in C(\partial D)$ , то её решение единственно.

### Решение ЗД методом конформных отображений.

Пусть  $D$  – жорданова область в  $\mathbb{C}$ ,  $h_0 \in C(\partial D)$ . Требуется решить ЗД.



Пусть  $\Omega$  – другая жорданова область,  $k$  – конформный изоморфизм  $D$  на  $\Omega$ , который по теореме Каратеодори (будет доказана в следующем семестре, а в конкретных задачах проверяется непосредственно) можно продолжить до гомеоморфизма  $\overline{D}$  на  $\overline{\Omega}$ . Определим  $H_0(w) = h_0(k^{-1}(w)) \in C(\partial\Omega)$ . Предположим, что мы умеем решать ЗД в области  $\Omega$  для граничной функции  $H_0$ . Пусть  $H(w)$  – это решение. Тогда из теоремы 15.4 следует, что функция  $h(z) = H(k(z))$  является решением исходной ЗД в  $D$ . Указанный метод применим, например, если  $\Omega$  является кругом: для кругов в следующем семестре будет обоснован метод Фурье, а также установлена формула Пуассона решения ЗД при любой граничной функции.

**Разложение ГрФ в ряд по однородным гармоническим полиномам.**

Введем обозначение  $B_r = B(0, r)$ ,  $r > 0$ .

**ТЕОРЕМА 15.5.** (О разложении ГрФ в круге в ряд по однородным гармоническим полиномам). При фиксированных  $R > 0$ ,  $\varepsilon > 0$  пусть  $h \in \mathcal{H}(B_{R+\varepsilon})$ . Тогда в  $\overline{B}_R$  функция  $h$  представляется в следующем виде:

$$h(re^{i\varphi}) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} r^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)), \quad 0 \leq r \leq R, \quad (15.2)$$

где

$$A_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\theta}) \cos(n\theta) d\theta, \quad n \in \{0, 1, \dots\}; \quad (15.3)$$

$$B_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\theta}) \sin(n\theta) d\theta, \quad n \in \{1, 2, \dots\}. \quad (15.4)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** По теореме 15.1 существует единственная функция  $f \in \mathcal{A}(B_{R+\varepsilon})$  с условием  $Re f = h$ ,  $f(0) = h(0)$ .

Разложим  $f$  в ряд Тейлора с центром  $z_0 = 0$ :

$$f(z) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n z^n,$$

где  $c_n = a_n + ib_n$ ,  $c_0 = a_0$  (все  $a_n$  и  $b_n$  вещественны). При любом  $r \in (0, R+\varepsilon)$ , подставляя в последнее разложение  $z = re^{i\varphi}$ , находим:

$$f(re^{i\varphi}) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + ib_n) r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Теперь приравняем в последнем разложении вещественные части:

$$h(re^{i\varphi}) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} r^n (a_n \cos(n\varphi) - b_n \sin(n\varphi)).$$

Все указанные разложения сходятся абсолютно и равномерно на  $\overline{B}_R$ . Таким образом, установили (15.2) при  $A_0 = 2a_0$ ,  $A_n = a_n$ ,  $B_n = -b_n$ .

Возьмем теперь  $z = Re^{i\varphi}$ :

$$h(Re^{i\varphi}) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} R^n (a_n \cos(n\varphi) - b_n \sin(n\varphi)).$$

Слева здесь стоит  $2\pi$ -периодическая функция (аргумента  $\varphi$ ) класса  $C^\infty$ , а справа – тригонометрический ряд, который должен совпадать с рядом Фурье этой функции:  $a_0 = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\theta}) d\theta$ ,

$$a_n R^n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\theta}) \cos(n\theta) d\theta, \quad -b_n R^n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\theta}) \sin(n\theta) d\theta, \quad n \in \{1, 2, \dots\},$$

откуда получаем (15.3) и (15.4). □

*Замечание.* Всякая вещественная линейная комбинация гармонических функций  $Re((x+iy)^n) = Re(z^n) = r^n \cos(n\varphi)$  и  $Im((x+iy)^n) = Im(z^n) = r^n \sin(n\varphi)$  называется *однородным гармоническим полиномом порядка  $n$*  (по переменным  $x, y$ ).

**УПРАЖНЕНИЕ 15.3.** Найти размерность пространства всех гармонических полиномов (по  $x, y$ ) степени не выше  $N$ ,  $N \in \mathbb{N}$ .